



جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش عالی


سازمان پژوهش‌های علمی

سال دوم

آموزش متوسطه عمومی

ریاضی و فیزیک

# ریاضیات جدید



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# ریاضیات جدید


سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  
مرکز اسناد و اطلاع رسانی  
آرشیو کتابهای درسی  
شماره ثبت: ۵۵۴۱۰ تاریخ: ۱۳۶۶/۱۲/۸۲

سال دوم

آموزش متوسطه عمومی

ریاضی و فیزیک

۱۳۶۰



۱۴۲۰  
۵۱.  
۲۶  
۲۰۵

حقوق مادی این اثر متعلق به وزارت  
آموزش و پرورش است

پدیدآورندگان

مؤلفان ◀ ● فرشید مبین باشیان ● میرزا جلیلی

صفحه پرداز ◀ ● طهمورث حسن پور

چاپ از ◀ ● چاپخانه احمدی

## فهرست

۱	فصل ۱ - رابطه و تابع
۴۴	فصل ۲ - ماتریس
۸۹	فصل ۳ - بردار
۱۱۸	فصل ۴ - گروه

لطفاً قبل از مطالعه این کتاب به نکات زیر توجه فرمایید.

الف - اگر  $A$  يك مجموعه و  $a \in A$  .  $a$  را يك عنصر و يا يك عضو از  $A$  می نامیم .  
ب- مجموعه

$$\{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

را مجموعه اعداد طبیعی و يا مجموعه اعداد درست مثبت نامیده و با  $N$  نشان می دهیم .  
ب- مجموعه

$$\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

را مجموعه اعداد درست نامیده و با  $Z$  نشان می دهیم .  
ت- مجموعه

$$\left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in Z, q \neq 0 \right\}$$

را مجموعه اعداد گویا نامیده و با  $Q$  نشان می دهیم .

ث- هر عدد حقیقی که گویا نباشد، يك عدد ناگویا (ویا کنگ) نامیده می شود .

ج- مجموعه اعداد حقیقی را با  $R$  نشان می دهیم .

## رابطه و تابع

## رابطه

## زوج مرتب

هر دوشی تشکیل يك زوج را می‌دهد. برای مثال ۳ و ۴ يك زوج از اعداد حقیقی است. اگر در يك زوج ترتیب در نظر گرفته شود گوئیم يك زوج مرتب داریم. بنابراین زوج مرتب ۳ و ۴ با زوج مرتب ۴ و ۳ متفاوت است.

يك زوج مرتب  $a$  و  $b$  معمولا با نماد  $(a, b)$  نشان داده میشود.  $a$  عضو اول (و یا مؤلفه اول) و  $b$  عضو دوم (و یا مؤلفه دوم) زوج مرتب  $(a, b)$  نامیده میشود. از آنچه گفته شد نتیجه میشود که اگر  $a \neq b$ ، آن گاه  $(a, b) \neq (b, a)$ . برای مثال  $(1, 2) \neq (2, 1)$ .

باید توجه داشت که زوج مرتب  $(a, b)$  و مجموعه  $\{a, b\}$  یکی نیستند.

همانطوریکه میدانید  $\{a, b\} = \{b, a\}$

یعنی، در مجموعه  $\{a, b\}$  ترتیب اعضا در نظر گرفته نمی‌شود، در صورتی که در يك زوج مرتب ترتیب نوشتن اعضا اهمیت دارد. همچنین همانطوریکه میدانید  $\{a, a\} = \{a\}$ ، در حالی که در زوجهای مرتب چنین نیست.

تساوی زوجهای مرتب - دو زوج مرتب  $(a, b)$  و  $(c, d)$  مساوی هستند اگر و تنها اگر عضوهای اول آنها با هم و عضوهای دوم آنها نیز با هم برابر باشند. به عبارت دیگر:

$$(a, b) = (c, d) \iff (a = c \text{ و } b = d)$$

ممکن است که عضو اول يك زوج مرتب خود يك زوج مرتب باشد:

$$((a, b), c)$$


در این صورت مینویسیم:

$$(a, b, c) = ((a, b), c)$$


و آن را يك سه تایی مرتب می‌خوانیم. در این سه تایی مرتب  $a, b$  و  $c$  به ترتیب عضو اول، عضو دوم و عضو سوم (و یا مؤلفه اول، مؤلفه دوم و مؤلفه سوم) نامیده میشوند.

## حاصل ضرب دکارتی دو مجموعه

مثال ۱ - سه شهر A ، B و C طوری واقع شده‌اند که بین A و B دو جاده و بین B و C سه جاده موجود است .



مسافری می‌خواهد از شهر A و از طریق B به شهر C مسافرت کند . می‌خواهیم ببینیم او برای رسیدن به مقصد چه مسیرهایی برای انتخاب در اختیار دارد . روشن است که این مسافر برای رفتن از A به C ابتدا باید یکی از جاده‌های a یا c سپس یکی از جاده‌های b ، d یا e را بیاید . هر مسیری از A به C را می‌توان با یک زوج مرتب نشان داد که در آن عضو اول نمایش جاده اول و عضو دوم نمایش جاده دوم باشد . حال فرض کنید مسافر جاده a را پیموده و به شهر B رسیده است .




در اینجا برای رفتن به شهر C باید یکی از جاده‌های b ، d یا e و یا به عبارت دیگر یکی از مسیره‌های زیر را انتخاب کند :

$$(a, b), (a, d), (a, e)$$

اگر این مسافر از جاده c به شهر B رفته باشد ، در این صورت نیز برای رسیدن به مقصد باید

یکی از جاده‌های  $b, d, e$  و با یکی از مسیرهای زیر را انتخاب کند :



$$(c, b), (c, d), (c, e)$$

با توجه به مطالب فوق ، این مسافر جمعاً مسیرهای زیر را برای انتخاب در اختیار خواهد داشت :

$$(1) \quad (a, b), (a, d), (a, e), (c, b), (c, d), (c, e)$$


که عضو اول هر زوج مرتب از میان جاده‌های بین دو شهر A و B و عضو دوم آن از میان جاده‌های بین دو شهر B و C گرفته شده است . به عبارت دیگر ، هرگاه مجموعه جاده‌های بین شهرهای A و B را با  $E = \{a, c\}$  و مجموعه جاده‌های بین شهرهای B و C را با  $F = \{b, d, e\}$  نشان دهیم ، در نوشتن زوجهای مرتب (۱) عضو اول هر زوج مرتب از مجموعه E و عضو دوم آن از مجموعه F گرفته شده است . مجموعه این زوجهای مرتب را حاصل-ضرب دکارتی E در F خوانده آن را به صورت  $E \times F$  نشان می‌دهند :

$$E \times F = \{ (a, b), (a, d), (a, e), (c, b), (c, d), (c, e) \}$$

این حاصل ضرب با استفاده از جدول به صورت زیر نیز به دست می‌آید :


		مسیرهای دوم زوجها		
		b	d	e
مسیرهای اول زوجها	a	$(a, b)$	$(a, d)$	$(a, e)$
	c	$(c, b)$	$(c, d)$	$(c, e)$

فرض کنید مسافر ما به شهر C رسیده و حالا قصد برگشتن به شهر A از طریق B را دارد.





می‌خواهیم ببینیم او در سفر برگشت چه انتخابهایی می‌تواند داشته باشد. در اینجا مسافر ابتدا یکی از جاده‌های  $b$  یا  $d$  یا  $e$  را انتخاب می‌کند، سپس از طریق  $a$  یا  $c$  به مبدأ اصلی خویش یعنی شهر  $A$  برمی‌گردد. هر کدام از این مسیرها را نیز می‌توان بایک زوج مرتب نشان داد. مثلاً، اگر او ابتدا جاده  $b$  و بعد جاده  $a$  را انتخاب کند، این مسیر را با زوج مرتب زیر نشان می‌دهیم:



با این قرارداد و مطالبی که قبلاً گفته شد، مسیرهایی که این مسافر در برگشتن در اختیار خواهد داشت تشکیل مجموعه‌ای از زوجهای مرتب خواهند داد که عضو اول هر زوج مرتب از  $F = \{b, d, e\}$  و عضودوم آن از  $E = \{a, c\}$  گرفته می‌شود. جدول زیر تمام مسیرهای ممکن برگشت از شهر  $C$  به  $A$  (از طریق  $B$ ) را نشان می‌دهد:

		عضوهای دوم زوجها	
		$a$	$c$
عضوهای اول زوجها	$b$	$(b, a)$	$(b, c)$
	$d$	$(d, a)$	$(d, c)$
	$e$	$(e, a)$	$(e, c)$

مجموعه تمام زوجهای مرتب جدول فوق که همه مسیرهای برگشت از شهر C به A را نشان می‌دهد به نام حاصل ضرب دکارتی F در E خوانده شده آن را با  $F \times E$  نشان می‌دهند:


$$F \times E = \{ (b, a), (b, c), (d, a), (d, c), (e, a), (e, c) \}$$

اگرچه هر کدام از مجموعه‌های  $E \times F$  و  $F \times E$  دارای عضو می‌باشد ولی از تعریف زوج مرتب نتیجه می‌شود که حاصل ضربهای  $F \times E$  و  $E \times F$  مساوی نیستند:

$$E \times F \neq F \times E$$

مثال ۲- يك سكه ۵ ریالی و يك سكه ۲ ریالی را باهم می‌ریزیم. حالات مختلفی را که ممکن است این دو سکه به زمین بنشینند بنویسید.

حل: هر سکه دو رو دارد. سکه ۵ ریالی بعد از فرود آمدن شیر یا خط می‌نشیند. هرگاه نشستن شیر را با حرف «ش» و نشستن خط را با حرف «خ» نشان می‌دهیم، روشن است که پس از نشستن سکه ۵ ریالی یکی از عضوهای مجموعه  $\{ش, خ\}$  را خواهیم داشت. به همین ترتیب پس از نشستن سکه ۲ ریالی باز یکی از عضوهای مجموعه  $\{ش, خ\}$  را به دست می‌آید. حالات مختلف نشستن این دو سکه باهم با استفاده از نموداری به نام نمودار درختی به صورت زیر به دست می‌آید:



مجموعه این زوجهای مرتب به نام حاصل ضرب دکارتی A در A خوانده شده آن را به صورت زیر می‌نویسیم:

$$A \times A = \{ (ش، ش), (ش، خ), (خ، ش), (خ، خ) \}$$

تعریف - حاصل ضرب دکارتی دو مجموعه  $A$  و  $B$  برابر است با مجموعه تمام زوجهای مرتب  $(a, b)$  که در آن  $a \in A$  و  $b \in B$ . به عبارت دیگر :

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ و } b \in B \}$$

به همین ترتیب  $B \times A$  به صورت زیر تعریف می شود :

$$B \times A = \{ (b, a) \mid b \in B \text{ و } a \in A \}$$

هرگاه مجموعه  $A$  دارای  $n$  عضو و مجموعه  $B$  دارای  $m$  عضو باشد، هر یک از مجموعه های  $A \times B$  یا  $B \times A$  دارای  $mn$  عضو بوده و در حالت کلی داریم :

$$A \times B \neq B \times A$$

در حالت  $A = B$ ،  $A \times A$  به نام حاصل ضرب دکارتی مجموعه  $A$  در خودش خوانده می شود. این حاصل ضرب دکارتی، مجموعه تمام زوجهای مرتب  $(a, b)$  است که در آن  $a \in A$  و  $b \in A$ . یعنی این که :

$$A^2 = A \times A = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ و } b \in A \}$$

مثال - دو مجموعه  $A = \{ ۱, ۲, ۳ \}$  و  $B = \{ a, b \}$  داده شده است؛ الف : حاصل ضربهای  $A \times B$ ،  $B \times A$ ،  $A \times A$  و  $B \times B$  را بنویسید. ب : حاصل ضرب  $B \times B$  را به صورت نمودار درختی نشان دهید :

حل : الف - مجموعه تمام زوجهای مرتبی است که عضو اول آنها از  $A$  و عضو دوم آنها از  $B$  گرفته می شود :

$$A \times B = \{ (۱, a), (۲, a), (۳, a), (۱, b), (۲, b), (۳, b) \}$$

به همین ترتیب حاصل ضرب  $B \times A$  مجموعه تمام زوجهای مرتبی است که عضو اول هر زوج از  $B$  و عضو دوم آن از  $A$  گرفته شده است :

$$B \times A = \{ (a, ۱), (a, ۲), (a, ۳), (b, ۱), (b, ۲), (b, ۳) \}$$


همچنین

$$A \times A = \{ (۱, ۱), (۱, ۲), (۱, ۳), (۲, ۱), (۲, ۲), (۲, ۳), (۳, ۱), (۳, ۲), (۳, ۳) \}$$

و

$$B \times B = \{ (a, a), (a, b), (b, a), (b, b) \}$$

ب- در زیر حاصل ضرب  $B \times B$  به صورت نمودار درختی نشان داده شده است .



### تمرین

- ۱- در زوجهای زیر،  $x$  را به قسمی پیدا کنید که دو زوج باهم برابر شوند :  
 $(x-1, x+1)$  و  $(2, 4)$
- ۲- در زوجهای زیر،  $x$  و  $y$  را به قسمی پیدا کنید که دو زوج باهم برابر شوند :  
 $(x+y, x-y)$  و  $(5, 1)$
- ۳- دو مجموعه  $A = \{p, q, r\}$  و  $B = \{1, 2\}$  داده شده است حاصل ضربهای زیر را به دست آورید :

$$A \times B, B \times A, A \times A, B \times B$$

- ۴- سه مجموعه  $A = \{a, b\}$  و  $B = \{1, 2, 3\}$  و  $C = \{p, q, r\}$  داده شده است نشان دهید که :

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

- ۵- هرگاه  $A$  مجموعه دلخواه و غیرتهی باشد حاصل ضربهای زیر را به دست آورید :

$$A \times \emptyset \text{ و } \emptyset \times A$$

- ۶- حاصل ضربهای زیر را به دست آورید :

$$\{1, 2, 3, 4\} \times \{5, 6\}$$

الف -


ب -

$$\{x \mid x \text{ عدد طبیعی کوچکتر از } 10 \text{ و بزرگتر از } 6 \text{ است}\} \times \{x \mid x \text{ يك عدد طبیعی کوچکتر از } 4 \text{ است}\}$$

- ۷- مجموعه‌های  $A = \{۲, ۳\}$  و  $B = \{۱, ۳, ۵\}$  داده شده است. با استفاده از نمودار درختی حاصل ضربهای  $A \times A$ ,  $B \times A$ ,  $A \times B$  و  $B \times B$  را بنویسید.
- ۸- یک سکه ۵ ریالی و یک تاس را می‌ریزیم. حالات مختلفی را که ممکن است سکه و تاس به زمین بنشینند بنویسید.
- ۹- اگر  $A = \{۱, ۲, ۳, ۴\}$  و  $B = \{\emptyset\}$ . حاصل ضربهای دکارتی  $B \times A$  و  $A \times B$  را به دست آورید.

### رابطه


در آغاز فصل مثالی داشتیم که شخصی می‌خواهد از شهر A و از طریق B به شهر C مسافرت کند. همچنین گفتیم که از A به B دو راه و از B به C سه راه موجود می‌باشد:



دیدید که مجموعه مسیرهای مختلفی که این شخص برای رفتن از A به C (از طریق B) در اختیار دارد عبارت است از:

$$E \times F = \{ (a, b), (a, d), (a, e), (c, b), (c, d), (c, e) \}$$

بعضی اوقات به همه این مسیرها نیاز نداریم. به عبارت دیگر، همه عضوهای  $E \times F$  مورد احتیاج نیست بلکه با زوجهایی از  $E \times F$  کار داریم که هرکدام احیاناً در شرط خاصی صدق کند. مثلاً در مورد مثال فوق، فرض کنید طول جاده‌های a و c به ترتیب برابر ۲۰ و ۳۰ کیلومتر و طول راههای b، d و e به ترتیب ۵۰، ۴۰ و ۶۰ کیلومتر باشد.



هرگاه شخصی با ماشین خود مسافرت کند و فقط برای پیمودن ۷۵ کیلومتر راه بنزین داشته باشد می‌خواهیم ببینیم این شخص برای رسیدن از A به C چه مسیرهایی را می‌تواند انتخاب کند تا با کمبود بنزین مواجه نشود. در اینجا فرض می‌شود جاده‌ها با طولشان مشخص شده باشند؛ در این صورت با توجه به قراردادهای قبلی خواهیم داشت:

$$E = \{ ۲۰, ۳۰ \}, F = \{ ۴۰, ۵۰, ۶۰ \}$$

اگر این شخص بنزین کافی می‌داشت، همان‌طور که دیدید می‌توانست هرزوج از حاصل ضرب زیر را برای مسیر خود انتخاب کند:

$$E \times F = \{ (۲۰, ۴۰), (۲۰, ۵۰), (۲۰, ۶۰), (۳۰, ۴۰), (۳۰, ۵۰), (۳۰, ۶۰) \}$$

در این حاصل ضرب زوج مرتب (۲۰, ۴۰) نشان می‌دهد که مسافر ابتدا جاده ۲۰ کیلومتری سپس جاده ۴۰ کیلومتری را می‌پیماید. همچنین این زوج مرتب مشخص می‌سازد که طول این مسیر برابر  $۲۰ + ۴۰$  می‌باشد. بنابراین عضوهایی از حاصل ضرب دکارتی فوق که برای این مسافر مناسب خواهد بود زوجهای مرتبی است که در هر کدام از آنها مجموع دو عضو (مؤلفه) از ۷۵ کیلومتر بزرگ‌تر نمی‌باشد (تا بزرگتر)<sup>۱</sup> با توجه به مطلب فوق دیده می‌شود که فقط سه زوج از مجموعه  $E \times F$  یعنی:

$$(۲۰, ۴۰), (۲۰, ۵۰), (۳۰, ۴۰)$$

در شرط فوق صدق می‌کند مجموعه این سه زوج مرتب، یعنی:

$$\{ (۲۰, ۴۰), (۲۰, ۵۰), (۳۰, ۴۰) \}$$

که زیرمجموعه‌ای از  $E \times F$  می‌باشد به نام يك رابطه از E در F خوانده شده آن را با  $\mathcal{R}$  نشان می‌دهیم:

$$\mathcal{R} = \{ (۲۰, ۴۰), (۲۰, ۵۰), (۳۰, ۴۰) \}$$

فرض کنید شخص دیگری نیز بخواهد با ماشین خود از شهر A به C مسافرت کند و تنها برای پیمودن ۸۵ کیلومتر راه بنزین داشته باشد. می‌خواهیم ببینیم این شخص چه مسیرهایی می‌تواند انتخاب کند تا بدون کمبود بنزین به مقصد برسد. روشن است که هر عضو از حاصل ضرب  $E \times F$  که به عنوان مسیر انتخاب شود باید مجموع عضوهای (مؤلفه‌های) آن از ۸۵ کیلومتر کمتر یا حداکثر مساوی آن باشد<sup>۲</sup> با این ترتیب مسیرهایی که با زوجهای زیر مشخص می‌شوند برای مسافر دوم مناسب می‌باشد:

۱- هرگاه يك مسیر را در حالت کلی به  $(a, b)$  نشان دهیم شرط اعمال شده در اینجا عبارت است از  $a + b \leq ۷۵$ .

۲- در این حالت شرط اعمال شده عبارت است از  $a + b \leq ۸۵$ .

$$(۲۰،۴۰)، (۲۰،۵۰)، (۲۰،۶۰)، (۳۰،۴۰)، (۳۰،۵۰)$$

مجموعه این زوجهای مرتب نیز، زیر مجموعه‌ای از  $E \times F$  بوده بازیک رابطه از  $E$  در  $F$  می‌باشد.

$$\mathcal{S} = \{(۲۰،۴۰)، (۲۰،۵۰)، (۲۰،۶۰)، (۳۰،۴۰)، (۳۰،۵۰)\}$$

در این مثال فرض کنید شخص سومی با موتور از  $A$  به  $C$  مسافرت می‌کند و فقط برای پیمودن ۵۰ کیلومتر راه بنزین دارد آیا این موتور سوار چه مسیرهایی می‌تواند انتخاب کند تا بدون کمبود بنزین به مقصد برسد؟ مجموعه  $\mathcal{R} = \{(۲۰،۴۰)\}$  که تنها یک مسیر مشخص می‌نماید باز یک رابطه از  $E$  در  $F$  است.

مثال - مجموعه  $A = \{۲، ۴، ۶\}$  را در نظر گرفته حاصل ضرب  $A \times A$  را تشکیل

می‌دهیم:

$$A \times A = \{(۲،۲)، (۲،۴)، (۲،۶)، (۴،۲)، (۴،۴)، (۴،۶)، (۶،۲)، (۶،۴)، (۶،۶)\}$$

اکنون زوجهایی مرتب از  $A \times A$  را انتخاب می‌کنیم که «عضو (مؤلفه) اول هر کدام

دو واحد از عضو (مؤلفه) دوم آن بزرگتر باشد»، این زوجها عبارتند از:

$$(۴،۲)، (۶،۴)$$

مجموعه این زوجهای مرتب زیر مجموعه‌ای از  $A \times A$  بوده یک رابطه در  $A$  خوانده

می‌شود:

$$\mathcal{R} = \{(۴،۲)، (۶،۴)\}$$

هر کدام از مجموعه‌های زیر نیز یک رابطه در  $A$  است.

$$\mathcal{R}_1 = \{(۲،۴)، (۴،۴)، (۶،۲)\}$$

$$\mathcal{R}_2 = \{(۴،۶)، (۲،۶)، (۶،۶)\}$$

تعریف - هرگاه دو مجموعه  $A$  و  $B$  داده شده باشد هر زیر مجموعه‌ای از  $A \times B$  به نام یک

رابطه از  $A$  در  $B$  خوانده می‌شود. پس اگر  $\mathcal{R}$  یک رابطه از  $A$  در  $B$  باشد، خواهیم داشت:

$$\mathcal{R} \subset A \times B$$

در حالت  $A=B$ ،  $\mathcal{R}$  زیر مجموعه‌ای از  $A \times A$  خواهد بود:

$$\mathcal{R} \subset A \times A$$

در اینجا گفته می‌شود «رابطه  $\mathcal{R}$  در  $A$  تعریف شده است».

باید توجه داشت که هر رابطه یک مجموعه است. بنابراین تمام مطالبی که در مورد

مجموعه‌ها گفته شده است در اینجا نیز درست می‌باشد.

۱- اگر زوج دلخواهی از این حاصل ضرب را با  $(x, y)$  نشان دهیم شرط اعمال شده عبارت

$$y = x - ۲$$

مثال ۱- دو مجموعه  $A = \{ ۱, ۲, ۳ \}$  و  $B = \{ p, q \}$  داده شده است ؛ سه رابطه از مجموعه  $A$  در  $B$  را بنویسید .

حل : ابتدا حاصل ضرب دکارتی  $A \times B$  را تشکیل می دهیم :

$$A \times B = \{ (۱, p), (۲, p), (۳, p), (۱, q), (۲, q), (۳, q) \}$$

طبق تعریف فوق ، هر زیرمجموعه ای از این حاصل ضرب يك رابطه از  $A$  در  $B$  خواهد بود . در زیر سه رابطه نوشته شده است :

$$R_1 = \{ (۱, p), (۲, p), (۱, q), (۳, q) \}$$

$$R_2 = \{ (۳, q) \}$$

$$R_3 = \{ (۲, p), (۲, q), (۳, p), (۳, q) \}$$

آیا می توانید سه رابطه دیگر برای این مثال بنویسید ؟ آیا می توانید مجموعه مرجع رابطه های فوق را بیان کنید ؟

مثال ۲- مجموعه های زیر داده شده است :

$$A = \{ \text{سیروس ، بهرام ، احمد} \}$$

$$B = \{ \text{ابراهیم ، داریوش} \}$$

و داریم که :

« سیروس فرزند ابراهیم است » ؛ « بهرام فرزند ابراهیم است » ؛ احمد فرزند داریوش

است

هرگاه حروف  $a, b, c, d$  و  $e$  را به ترتیب برای اسامی احمد ، بهرام ، سیروس

و داریوش و ابراهیم به کار ببریم خواهیم داشت :

$$A = \{ a, b, c \}, B = \{ d, e \}$$

هرگاه رابطه ای را که شرط فرزند بودن در مجموعه انسانها به وجود می آورد با  $R_1$

نشان دهیم، خواهیم داشت :

$$R_1 = \{ (a, d), (b, e), (c, e) \}$$

اگر  $R$  يك رابطه از  $A$  در  $B$  بوده ،  $(a, b) \in R$  ، می نویسیم  $a R b$  و گوییم  $a$  و  $b$

به وسیله رابطه  $R$  با هم مربوطند. اگر  $(a, b) \notin R$  ، می نویسیم  $a \not R b$  .

مثلا در مثال فوق داریم :

$$a R_1 d \text{ و } b R_1 e \text{ و } c R_1 e$$

۱- در این قرارداد  $a R b$  و  $b R a$  با هم فرق دارد .



مثال ۳- اگر  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  پس مجموعه:

$$\mathcal{R}_1 = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in A \text{ و } y = x + 2 \}$$

يك رابطه در  $A$  است. (چرا؟)

مثال ۴- مجموعه زیر يك رابطه در مجموعه اعداد حقیقی است. (چرا؟)

$$\mathcal{G} = \{ (x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R} \text{ و } y = x^2 \}$$

مثال ۵- روابط  $\mathcal{R}_1$  و  $\mathcal{R}_2$  در مجموعه  $A = \{3, 6, 9\}$  به ترتیب به صورتهای

زیر تعریف شده است:

$$\mathcal{R}_1 = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in A \text{ و } x > y \} \quad \text{الف-}$$

$$\mathcal{R}_2 = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in A \text{ و } y = x \} \quad \text{ب-}$$

هر يك از این رابطه‌ها را به صورت مجموعه‌ای از زوجهای مرتب بنویسید:

حل: ابتدا حاصل ضرب  $A \times A$  را تشکیل می‌دهیم:

$$A \times A = \{ (3, 3), (3, 6), (3, 9), (6, 3), (6, 6), (6, 9), (9, 3), (9, 6), (9, 9) \}$$

الف- زوجهای از این حاصل ضرب را انتخاب می‌کنیم که در هر زوج عضو اول بزرگتر

از عضو دوم باشد:

$$(6, 3), (9, 3), (9, 6)$$

$$\mathcal{R}_1 = \{ (6, 3), (9, 3), (9, 6) \} \quad \text{پس:}$$

ب- زوجهای از  $A \times A$  را می‌نویسیم که در آنها عضو اول برابر عضو دوم باشد:

$$(3, 3), (6, 6), (9, 9)$$

پس:

$$(2) \quad \mathcal{R}_2 = \{ (3, 3), (6, 6), (9, 9) \}$$

### دامنه و برد يك رابطه

تعریف - مجموعه‌ای که از مؤلفه‌های اول زوجهای يك رابطه تشکیل می‌شود، دامنه آن

رابطه نامیده می‌شود. همچنین مجموعه‌ای که از مؤلفه‌های دوم زوجهای يك رابطه تشکیل می‌شود،

برد آن رابطه نامیده می‌شود. به عبارت دیگر اگر  $\mathcal{R}$  يك رابطه از  $A$  در  $B$  باشد، مجموعه

$\{x \in A \mid (x, y) \in \mathcal{R}\}$  دامنه  $\mathcal{R}$  و مجموعه  $\{y \in B \mid (x, y) \in \mathcal{R}\}$  برد  $\mathcal{R}$  نامیده می‌شوند.

با گاهی دامنه يك رابطه را  $D$  و برد آن را با  $\Delta$  نشان می‌دهیم. با کمی دقت ملاحظه خواهید

کرد که در مثال ۵:

$$\mathcal{R}_1 \text{ دامنه} = \{6, 9\} \text{ و } \mathcal{R}_1 \text{ برد} = \{3, 6\}$$

$$\mathcal{R}_2 \text{ دامنه} = \{3, 6, 9\} \text{ و } \mathcal{R}_2 \text{ برد} = \{3, 6, 9\}$$

اگر  $\mathcal{R} = A \times B$  ، آن گاه دامنه و برد  $\mathcal{R}$  به ترتیب برابر با مجموعه های  $A$  و  $B$  خواهند بود .

### نمودار يك رابطه

الف - نمودار پیکانی - رابطه  $\mathcal{R}$  به صورت زیر تعریف شده است .

$$\mathcal{R} = \{ (\text{شربت، فرید}) ، (\text{شیر، فرید}) ، (\text{شربت، فرهاد}) ، (\text{شیر، فرهاد}) ، (\text{چای، رضا}) \}$$


اگر زوج مرتب دلخواهی از این رابطه را با  $(x, y)$  نشان دهیم، در این صورت می توان نوشت:

«  $y$  آشامیدنی مورد علاقه  $x$  است »

طبق آنچه در بالا دیدید، دامنه و برد  $\mathcal{R}$  برابر است با :

$$D = \{ \text{فرید ، فرهاد ، رضا} \} ;$$

$$\Delta = \{ \text{شربت ، شیر ، چای} \}$$



هر گاه از نمودار  $\mathcal{R}$  برای نمایش  $D$  و  $\Delta$  استفاده


کرده عضوهای  $D$  را در یک منحنی بسته و عضوهای  $\Delta$

را در منحنی بسته دیگر بنویسیم . سپس اسم هر نفر را

با پیکانی به اسم آشامیدنی مورد علاقه اش وصل

کنیم شکل روبه رو به دست می آید که به نام نمودار

پیکانی  $\mathcal{R}$  خوانده می شود .



اگر رابطه  $\mathcal{R}$  از مجموعه  $A$  در  $B$  تعریف شده

باشد ، معمولاً به جای  $D$  و  $\Delta$  از  $A$  و  $B$  استفاده

می کنیم که در این صورت لازم نیست از هر عضو  $A$

پیکانی خارج و یا به هر عضوی از  $B$  پیکانی وارد

شود . مانند شکل روبه رو :

مثال ۱ - رابطه  $\mathcal{H}$  در مجموعه  $A = \{ ۲ ، ۳ ، ۴ \}$  به صورت زیر تعریف شده


است :

$$\mathcal{H} = \{ (x, y) \mid x \in A, y \in A \text{ و « } y \text{ بخش پذیر است »} \}$$

دامنه و برد  $\mathcal{H}$  را تعیین کرده نمودار پیکانی آن را رسم کنید .

حل : حاصل ضرب دکارتی  $A \times A$  را تشکیل می دهیم :

$$A \times A = \{ (۲،۲) ، (۲،۳) ، (۲،۴) ، (۳،۲) ، (۳،۳) ، (۳،۴) ، (۴،۲) ، (۴،۳) ، (۴،۴) \}$$




حال زیرمجموعه‌ای از  $A \times A$  می‌نویسیم که در آن عضو اول هر زوج مرتب بر عضو دوم آن بخش‌پذیر باشد.

$$R = \{ (۲, ۲), (۳, ۳), (۴, ۴), (۲, ۳), (۳, ۴) \}$$

در این صورت دامنه و برد آن عبارتند از :

$$R \text{ دامنه} = \{۲, ۳, ۴\}; R \text{ برد} = \{۲, ۳, ۴\}$$

نمودار  $R$  در روبه‌رو رسم شده است :



مثال ۲ - رابطه  $R$  از مجموعه  $X$  در  $Y$  طبق

نمودار روبه‌رو تعریف شده است. این رابطه را با زوجهای مرتب نشان دهید.

حل : در اینجا رابطه  $R$  از زوجهای مرتبی تشکیل می‌شود که در نمودار آن از عضو اول هر زوج اقلایک پیکان خارج شده و به عضو دوم آن زوج ختم می‌شود. بنا بر این رابطه مزبور عبارت است از :


$$R = \{ (a, ۱), (b, ۱), (b, ۲), (c, ۳) \}$$

ب - نمودار دکارتی - روش دیگر برای نمایش رابطه :

$$R = \{ (\text{شربت}, \text{فرید}), (\text{شیر}, \text{فرید}), (\text{شربت}, \text{فرهاد}), (\text{شیر}, \text{رضا}), (\text{چای}, \text{رضا}) \}$$

استفاده از نمودار دکارتی یا نمودار مختصاتی است. بدین ترتیب که دو خط متقاطع را

در صفحه رسم کرده ( شکل زیر ) روی یکی در فواصل معین عضوهای دامنه :




{ فرید ، فرهاد ، رضا }

و روی دیگری به فواصل معین عضوهای برد :

{ شربت ، شیر ، چای }

را نقل می کنند ؛ سپس از نقاط مشخص شده خطوطی موازی با دوخط اصلی رسم کرده نقطه های تلاقی این خطها را نقاط نظیر زوجهای رابطه می گیرند . مثلاً نقطه نظیر زوج ( شیر ، رضا ) در محل تلاقی دو خطی قرار گرفته که از نقاط رضا و شیر موازی با دوخط اصلی رسم شده است . به همین ترتیب سایر نقاط متناظر با زوجهای  $\mathcal{R}$  به دست می آید (شکل زیر) .



این شکل را دستگاه مختصات نامیده نقطه نظیر زوج (شیر، رضا) را در صفحه نمودار این زوج و مجموعه این نقاط را نمودار مختصاتی یا نمودار دکارتی رابطه  $\mathcal{R}$  می خوانند .

از نمودار مختصاتی بیشتر برای نمایش رابطه هایی که عضوهای آنها زوجهای مرتب از اعداد حقیقی باشند استفاده می شود . به عبارت دیگر ، در نمودار مختصاتی در صفحه یک تناظر یک به یک بین نقاط صفحه و زوجهای مرتب از اعداد حقیقی وجود دارد . اگر یکی از دوخط اصلی را به طور افقی و دیگری را عمود بر آن در صفحه رسم کنیم شکل حاصل را دستگاه مختصات قائم می نامیم . در دستگاه مختصات قائم ، محل تلاقی دوخط اصلی را نظیر زوج ( ۰ ، ۰ ) گرفته آن را با حرف O مشخص می کنند ، سپس روی خط افقی که به نام محور x ها یا محور طولها خوانده می شود ، و در سمت راست O با انتخاب واحد مناسب اعداد مثبت و درست چپ O ، اعداد منفی دامنه را نقل می کنند . به همین ترتیب روی خط قائم که به نام محور y ها یا محور عرضها نامیده می شود ، در طرف بالای O اعداد مثبت و در طرف پایین O اعداد منفی برد را نقل می کنند . آن گاه نمودار نظیر هر زوج را مطابق آنچه که گفته شد به دست می آورند . به مثالهای زیر توجه کنید :

مثال ۱- رابطه زیر در مجموعه اعداد درست تعریف شده است .


$$\mathcal{R} = \{ (-۲, ۰), (-۱, ۰), (۰, ۰), (۱, ۱), (۲, ۰), (۰, -۱), (۰, -۲) \}$$

مطلوب است تعیین دامنه و برد و رسم نمودار مختصاتی آن :

حل : ابتدا دامنه و برد  $\mathcal{D}$  را طبق آنچه که گفته شد می نویسیم :

$$\mathcal{D} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}, \quad \text{برد } \mathcal{R} = \{0, 1, -1, -2\}$$

آن گاه نمودار مختصاتی  $\mathcal{D}$  را مطابق آنچه که در بالا توضیح داده شد رسم می کنیم (شکل زیر)



مثال ۲ - رابطه :  $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x + y = 1\}$  در مجموعه اعداد درست تعریف

شده است .

مطلوب است تعیین دامنه و برد و رسم نمودار مختصاتی  $\mathcal{R}$  .

حل : طبق آنچه گفته شده است داریم :  $\mathcal{R} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  ؛ حال زوجیهایی از  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  را انتخاب

می کنیم که مجموع عضوهای آن برابر يك باشد :

$$\mathcal{R} = \{\dots, (-4, 5), (-3, 4), (-2, 3), (-1, 2), (0, 1), (1, 0), (2, -1), (3, -2), \dots\}$$


دامنه و حوزه این رابطه برابر است با :

$$\mathcal{D} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$


$$\mathcal{R} = \{\dots, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, \dots\}$$

هر گاه نمودار مختصاتی تمام زوجیهای  $\mathcal{R}$  را در صفحه رسم کنیم، نقطه هایی به تعداد نامتناهی


به دست می آید که همه آنها بر يك خط راست واقعند. قسمتی از این نمودار در شکل رسم شده است .



اگر رابطه  $\mathcal{R} = \{ (x, y) \mid x + y = 1 \}$  در مجموعه اعداد حقیقی تعریف شده بود  
در این صورت نمودار این رابطه یک خط راست پیوسته نامحدود به صورت زیر می بود :



## رابطه وارون (معکوس)



رابطه  $R$  از مجموعه  $A = \{1, 2, 3\}$  در مجموعه


$B = \{a, b\}$  به صورت زیر تعریف شده است :

$$R = \{(1, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$$

هرگاه عضوهای هر کدام از زوجهای مرتب متعلق

به  $R$  را جا به جا کنیم رابطه جدیدی به صورت زیر

به دست می آید که از  $B$  در  $A$  می باشد :



$$\{(a, 1), (b, 2), (a, 3), (b, 1)\}$$

رابطه جدید را وارون رابطه  $R$  خوانده آن را با

$R^{-1}$  نمایش می دهیم :

$$R^{-1} = \{(a, 1), (b, 2), (a, 3), (b, 1)\}$$

تعریف - هرگاه  $R$  رابطه ای از  $A$  در  $B$  باشد ، رابطه

وارون  $R$  را با  $R^{-1}$  نشان داده و بصورت زیر تعریف

میکنیم :

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$$

با توجه به مطالب فوق می توان گفت که هرگاه  $R^{-1}$  وارون  $R$  باشد داریم :

$$\text{دامنه } R^{-1} = \text{بردا } R \text{ و } \text{بردا } R^{-1} = \text{دامنه } R$$

## تمرین

۱- دو مجموعه  $X = \{1, 2, 3, 4\}$  و  $Y = \{1, 3, 5\}$  داده شده اند . الف : حاصل

ضرب دکارتی  $X \times Y$  را بنویسید . ب : رابطه  $\{(x, y) \in X \times Y \mid x > y\}$  از  $X$  در  $Y$  را به صورت زوجهای مرتب نشان دهید .

۲- رابطه :  $\{(x, y) \mid x + y = 4\}$  در مجموعه اعداد درست تعریف شده است .

الف: این رابطه را به صورت مجموعه ای از زوجهای مرتب بنویسید . ب: دامنه و برد

آنها بنویسید .

۳- رابطه  $R$  در مجموعه  $A = \{a, b, c, d\}$  به صورت زیر تعریف شده

است :


$$R = \{(a, b), (b, a), (b, b), (b, d), (c, c), (d, a), (d, b)\}$$

الف - تحقیق کنید کدام يك از گزاره‌های زیر درست است :

$$c \not\mathcal{R} b, d \not\mathcal{R} a, a \mathcal{R} c, b \not\mathcal{R} b, b \not\mathcal{R} d, a \mathcal{R} b$$

ب- هرگاه داشته باشیم :  $\mathcal{R} = \{x \in A \mid (x, b) \in \mathcal{R}\}$  ، مجموعه  $\mathcal{R}$  را مشخص نمایید.

پ- رابطه  $\mathcal{R}$  با نمودار زیر تعریف شده است :



این رابطه را به صورت مجموعه‌ای از زوجهای مرتب بنویسید .

د- رابطه  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 13\}$  در مجموعه  $A = \{-3, -2, 1, 2, 3\}$

تعریف شده است .


الف: این رابطه را به صورت مجموعه‌ای از زوجهای مرتب بنویسید. ب: دامنه و برد

این رابطه را مشخص کنید. ج: نمودار مختصاتی آن را رسم کنید .

پ- رابطه  $\mathcal{R} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9\}$  ، در مجموعه اعداد درست تعریف شده است .

نمودار مختصاتی آن را رسم کنید .


ع- رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  طبق نمودار زیر تعریف شده است :



این رابطه را به صورت مجموعه‌ای از زوجهای مرتب بنویسید.



۷- رابطه  $\mathcal{R}$  طبق نمودار زیر تعریف شده است :



این رابطه را به صورت مجموعه‌ای از زوجهای مرتب بنویسید .

۸- هریک از رابطه‌های زیر ، از مجموعه  $X = \{1, 2, 3\}$  در مجموعه

$Y = \{1, 2, 3, 4\}$  تعریف شده است . این رابطه‌ها را به صورت مجموعه‌ای از زوجهای مرتب نشان دهید .

$$\mathcal{R}_1 = \{ (x, y) \mid y = x \} ; \mathcal{R}_2 = \{ (x, y) \mid x + y = 4 \} \cap \{ (x, y) \mid y = 4 \}$$

$$\mathcal{R}_3 = \{ (x, y) \mid y < x \} \cup \{ (x, y) \mid y > x \} \cup \{ (x, y) \mid y = x \}$$

۹- رابطه  $\mathcal{R} = \{ (x, y) \mid y = 2x \}$  در مجموعه اعداد طبیعی تعریف شده است  $\mathcal{R}^{-1}$

را مشخص کنید .

### خواص بعضی از رابطه‌ها


دایره موازی را در مجموعه خطوط در نظر بگیرید . هرگاه  $D_1$  ،  $D_2$  و  $D_3$  سه خط دلخواه باشند ، طبق آنچه در هندسه خوانده‌اید :

الف - هر خط با خودش موازی است .

$$D_1 \parallel D_1$$

ب - اگر خط  $D_1$  موازی  $D_2$  باشد ، آن‌گاه





خط  $D_2$  نیز موازی  $D_1$  خواهد بود و بالعکس .

$$D_1 \parallel D_2 \iff D_2 \parallel D_1$$

ج - اگر خط  $D_1$  موازی  $D_2$  و خط  $D_2$  موازی

$D_3$  باشد ، آن گاه خط  $D_1$  موازی  $D_3$  است .

$$(D_1 \parallel D_2 \wedge D_2 \parallel D_3) \Rightarrow D_1 \parallel D_3$$

د رابطه تساوی را در مجموعه اعداد در نظر بگیرید . هرگاه  $a$  ،  $b$  و  $c$  سه عدد دلخواه

باشند ، طبق آنچه که در حساب خوانده اید :

الف - هر عدد با خودش برابر است :  $a = a$

ب - اگر عدد  $a$  برابر  $b$  باشد ، آن گاه عدد  $b$  نیز برابر  $a$  است و بالعکس .

$$(a = b) \iff (b = a)$$

ج - اگر عدد  $a$  مساوی  $b$  و عدد  $b$  مساوی  $c$  باشد ، آن گاه عدد  $a$  با  $c$  مساوی خواهد بود :

$$(a = b \wedge b = c) \Rightarrow (a = c)$$

د رابطه تشابه را در مجموعه شکل های هندسی در نظر بگیرید . این رابطه نیز دارای سه

خاصیت الف ، ب و ج مشروح در بالاست . آیا رابطه دیگری را می شناسید که دارای این سه

خاصیت باشد؟ در اینجا ما ابتدا سه خاصیت الف ، ب و ج رابطه ها را با دقت مورد مطالعه

قرارداده سپس از رابطه هایی که دارای این سه خاصیت باهم باشند بحث خواهیم کرد .

خاصیت الف - دیدید که رابطه توازی در مجموعه خطوط دارای این خاصیت است که

هر خط با خودش موازی است . به عبارت دیگر ، اگر  $D_1$  يك خط در صفحه باشد ، پس

$$D_1 \parallel D_1$$

به طور کلی هرگاه رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A$  دارای این خاصیت باشد که هر عضو  $A$  با خودش

به وسیله رابطه  $\mathcal{R}$  مربوط شود ، در این صورت گفته می شود  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A$  دارای خاصیت بازتابی

است . این مطلب را با نمادهای ریاضی به صورت زیر بیان می کنیم :

$$\forall a \in A , (a, a) \in \mathcal{R}$$

مثال ۱ - رابطه  $\mathcal{R} = \{ (1,1), (1,3), (2,2), (2,3), (3,4), (4,4), (5,5) \}$  در مجموعه  $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$  تعریف شده است . آیا رابطه  $\mathcal{R}$  خاصیت بازتابی دارد .

حل : در این مثال  $3 \in A$  ولی  $(3, 3) \notin \mathcal{R}$  ، بنابراین طبق آنچه گفته شد  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت بازتابی نیست اما رابطه  $\mathcal{R}_1$  که در مجموعه  $A$  به صورت زیر تعریف شده

است .

$$\mathcal{R}_1 = \{ (1,1), (1,3), (2,2), (2,3), (3,4), (3,3), (4,4), (5,5) \}$$

دارای خاصیت بازتابی است .


مثال ۲ - رابطه « $x$  برای  $y$  کار می کند» در مجموعه انسانها تعریف شده است. آیا این رابطه دارای خاصیت بازتابی است؟

حل : چون بعضی افراد برای خودشان و بعضی افراد برای دیگران کار می کنند ، لذا رابطه مزبور دارای خاصیت بازتابی نیست .  
خاصیت ب - یکی دیگر از خواصی که در مورد دو خط موازی  $D_1$  و  $D_2$  بیان کردیم عبارت بود از :

اگر خط  $D_1$  موازی  $D_2$  باشد ، آن گاه خط  $D_2$  نیز موازی  $D_1$  است و بالعکس .

$$D_1 \parallel D_2 \iff D_2 \parallel D_1$$

موازی است با



از نظر نموداری این رابطه را به صورت

رو به روشن می دهیم :

این خاصیت را خاصیت تقارنی رابطه توازی می خوانند .

فرض کنید  $\mathcal{R}$  رابطه ای در  $A$  باشد ؛ گوئیم رابطه  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت تقارنی است هرگاه برای هر  $a$  و  $b$  متعلق به  $A$  داشته باشیم :

$$a\mathcal{R}b \iff b\mathcal{R}a \quad \text{یا} \quad (a,b) \in \mathcal{R} \iff (b,a) \in \mathcal{R}$$

رابطه  $\subset$  در خانواده مجموعه ها خاصیت تقارنی ندارد . زیرا برای دو مجموعه دلخواه

$A$  و  $B$  از  $A \subset B$  نمی توان نتیجه گرفت که  $B \subset A$  و بالعکس ، یعنی این که :

$$A \subset B \not\iff B \subset A$$

همچنین رابطه « $<$ » در مجموعه اعداد حقیقی خاصیت تقارنی ندارد . زیرا برای دو

$$a < b \not\iff b < a$$

عدد دلخواه  $a$  و  $b$  داریم :

همچنین رابطه « $x$  برادر  $y$  است» در مجموعه انسانها دارای خاصیت تقارنی نیست زیرا

اگر  $x$  برادر  $y$  باشد ، ممکن است  $y$  خواهر  $x$  باشد. ولی همین رابطه در مجموعه مردان دارای

خاصیت تقارنی است . طبق آنچه راجع به رابطه معکوس دیدید می توان گفت که «رابطه  $\mathcal{R}$

در مجموعه  $A$  دارای خاصیت تقارنی است اگر فقط اگر  $\mathcal{R}^{-1} = \mathcal{R}$  :

خاصیت ج - خاصیت دیگری که در رابطه توازی دو خط بحث شد عبارت بود از :

هرگاه خط  $D_1$  موازی  $D_2$  و خط  $D_2$  موازی  $D_3$  باشد ، آن گاه  $D_1$  موازی  $D_3$  است .

$$(D_1 \parallel D_2) \wedge (D_2 \parallel D_3) \Rightarrow D_1 \parallel D_3$$

در ریاضیات و در زندگی روزمره روابط بسیاری وجود دارد که دارای این خاصیت می باشند.

مثلا رابطه « $x$  هم قد  $y$  است» در مجموعه انسانها دارای همین خاصیت می باشد. این خاصیت را خاصیت ترابایی رابطه توازی و یا رابطه « $x$  هم قد  $y$  است» خوانده می شود.

فرض کنید  $\mathcal{R}$  رابطه مفروضی در مجموعه  $A$  باشد، گوئیم رابطه  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت ترابایی است هرگاه برای هر  $a, b, c$  و  $c$  متعلق به  $A$  داشته باشیم:

$$(a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c) \Rightarrow a\mathcal{R}c \quad \text{یا} \quad ((a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, c) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (a, c) \in \mathcal{R}$$

رابطه « $<$ » در مجموعه اعداد حقیقی دارای خاصیت ترابایی است. زیرا برای هر سه عدد  $a, b, c$  طبق آنچه در جبر و حساب خوانده اید داریم:

$$(a < b \wedge b < c) \Rightarrow (a < c)$$

همچنین رابطه « $\subset$ » در خانواده مجموعه ها دارای خاصیت ترابایی است. زیرا برای هر سه مجموعه  $A$  و  $B$  و  $C$  داریم:

$$(A \subset B \wedge B \subset C) \Rightarrow (A \subset C)$$

آیا رابطه « $x$  مقسوم علیه  $y$  است» در مجموعه اعداد طبیعی دارای خاصیت ترابایی است.

### رابطه هم ارزی

دیدید که رابطه توازی در مجموعه خطوط دارای سه خاصیت بازتابی، تقارنی و ترابایی است. این رابطه مثالی از یک رابطه هم ارزی است.

تعریف - رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A$  تعریف شده است. گوئیم  $\mathcal{R}$  یک رابطه هم ارزی در  $A$  است هرگاه برای هر  $a, b, c$  و  $c$  متعلق به  $A$ :

الف -  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت بازتابی باشد، یعنی:  $\forall a \in A, (a, a) \in \mathcal{R}$

ب -  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت تقارنی باشد. یعنی:  $\forall a, b \in A, (a, b) \in \mathcal{R} \iff (b, a) \in \mathcal{R}$

ج -  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت ترابایی باشد. یعنی:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, c) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (a, c) \in \mathcal{R}$$

مثال ۱ - رابطه « $x$  متشابه  $y$  است» در مجموعه شکل های هندسی یک رابطه هم ارزی است. زیرا:

الف - هر شکل با خودش متشابه است (خاصیت بازتابی)

ب - اگر شکل  $x$  متشابه  $y$  باشد، آن گاه شکل  $y$  نیز متشابه  $x$  است و بالعکس (خاصیت تقارنی)

ج - اگر شکل  $x$  متشابه  $y$  و  $y$  متشابه  $z$  باشد، آن گاه شکل  $x$  متشابه  $z$  است (خاصیت ترابایی).

مثال ۲ - رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A = \{۱, ۳, ۵, ۷\}$  به صورت زیر تعریف شده است:

$$\mathcal{R} = \{(۱, ۱), (۳, ۳), (۵, ۵), (۷, ۷), (۳, ۵), (۵, ۳), (۷, ۵), (۵, ۷), (۳, ۷), (۷, ۳)\}$$

آیا  $\mathcal{R}$  يك رابطه هم‌ارزی است ؟

حل : الف - خاصیت بازتابی: در این رابطه داریم :

$$(1,1) \in \mathcal{R}, (3,3) \in \mathcal{R}, (5,5) \in \mathcal{R}, (7,7) \in \mathcal{R}$$

یعنی هر عضو  $A$  با خودش بوسیله رابطه  $\mathcal{R}$  مربوط است. پس  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت بازتابی است.  
ب - خاصیت تقارنی :

$$(3,5) \in \mathcal{R} \iff (5,3) \in \mathcal{R}; (7,5) \in \mathcal{R} \iff (5,7) \in \mathcal{R}$$

$$(3,7) \in \mathcal{R} \iff (7,3) \in \mathcal{R}$$

پس طبق آنچه گفته شد  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت تقارنی است .

ج - خاصیت ترایایی در این رابطه داریم :

$$((3,5) \in \mathcal{R} \wedge (5,3) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (3,3) \in \mathcal{R}$$

$$((7,5) \in \mathcal{R} \wedge (5,3) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (7,3) \in \mathcal{R}$$

$$((3,7) \in \mathcal{R} \wedge (7,5) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (3,5) \in \mathcal{R}$$

یعنی  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت ترایایی است.  $\mathcal{R}$  دارای سه خاصیت، بازتابی، تقارنی و ترایایی بوده لذا يك رابطه هم‌ارزی است .

آیا رابطه: «  $x$  هم‌سن  $y$  است » یا «  $x$  هم‌قد  $y$  است » یا «  $x$  همنام  $y$  است » یا «  $x$  هم‌گروه خونی  $y$  است » در مجموعه انسانها، يك رابطه هم‌ارزی است. چرا ؟

### دسته‌های هم‌ارزی<sup>۱</sup>

رابطه « هم‌کلاس بودن » را در مجموعه دانش‌آموزان يك دبیرستان در نظر گرفته‌آن را با  $\mathcal{R}$  نشان می‌دهیم . این رابطه دارای سه خاصیت زیر است :

الف - هر دانش‌آموز با خودش هم‌کلاس است. (خاصیت بازتابی)

ب - اگر  $x$  هم‌کلاس  $y$  باشد، آن‌گاه  $y$  نیز هم‌کلاس  $x$  است و بالعکس . (خاصیت تقارنی)

ج - اگر  $x$  هم‌کلاس  $y$  و  $y$  هم‌کلاس  $z$  باشد، آن‌گاه  $x$  هم‌کلاس  $z$  است. (خاصیت ترایایی)

پس رابطه « هم‌کلاس بودن » يك رابطه هم‌ارزی در مجموعه دانش‌آموزان این دبیرستان است. اگر رضا یکی از دانش‌آموزان این دبیرستان باشد، واضح است که مجموعه دانش‌آموزانی از دبیرستان که با رضا بوسیله رابطه بالا مربوطند، مجموعه تمام دانش‌آموزانی است که با او هم‌کلاس می‌باشند . در ریاضیات این کلاس را دسته هم‌دزی رضا نامیده آن را با « [ رضا ] » نشان می‌دهند .

۱ - طبقات هم‌ارزی نیز گفته شده است .

مجموعه تمام دانش آموزانی که با رضا هم کلاس میباشند = [رضا]

هریک از دانش آموزان دسته هم ارزی رضا (هم کلاسهای او) به نام يك عضو این دسته خوانده می شود. و رضا يك نماینده دسته هم ارزی رضاست. هرگاه حسین یکی از هم کلاسهای رضا باشد در این صورت دسته های هم ارزی: [رضا] و [حسین] باهم برابر هستند. زیرا، هر دو دسته مجموعه دانش آموزانی را نشان می دهند که با رضا و حسین در يك کلاس درس می خوانند. اگر مجموعه دانش آموزان این کلاس را B بنامیم خواهیم داشت:

$$[حسین] = B = [رضا]$$

اگر فرزاد دانش آموز دیگری از این دبیرستان بوده و متعلق به دسته هم ارزی B نباشد، روشن است که هیچ کدام از هم کلاسهای او نیز متعلق به دسته B نخواهد بود. این دانش آموزان نیز دسته هم ارزی دیگری در مجموعه دانش آموزان دبیرستان تشکیل می دهند:

مجموعه تمام دانش آموزانی که با فرزاد هم کلاس میباشند = [فرزاد]

طبق توضیحات فوق مجموعه های [رضا] و [فرزاد] جدا از هم می باشند.

دو دانش آموز دیگر این دبیرستان را به نام فرهاد و فرید در نظر گرفته فرض کنید آنها هم کلاس نبوده و هیچ کدام با رضا یا فرزاد نیز هم کلاس نباشند، در نتیجه این دو دانش آموز متعلق به دو دسته هم ارزی دیگر خواهند بود:

مجموعه تمام دانش آموزانی که با فرهاد هم کلاس میباشند = [فرهاد]

مجموعه تمام دانش آموزانی که با فرید هم کلاس میباشند = [فرید]

هرگاه مجموعه دانش آموزان دبیرستان مورد بحث را با A نمایش دهیم، رابطه هم ارزی «هم کلاس بودن» در A، این مجموعه را به دسته های هم ارزی (دانش آموزان هم کلاس) تقسیم می کند به طوری که داریم:

۱- هیچ کدام از این دسته ها تهی

نیست.

۲- این دسته های هم ارزی دویه دو

جدا از هم می باشند.


۳- اجتماع تمام دسته های هم ارزی

برابر مجموعه A است.

و این سه خاصیتی است که سال گذشته

برای افزایش مجموعه A گفته شد. بنابراین

می توان گفت:



هر رابطه هم ارزی در مجموعه مفروض A، این مجموعه را به دسته های هم ارزی افراز

می‌کند.

مجموعه‌ای را که از همه این دسته‌های هم‌ارزی تشکیل شده است با  $A/\mathcal{R}$  نمایش می‌دهند در مثال بالا خواهیم داشت :

$$A/\mathcal{R} = \{ [ \text{فرهاد} ] , \dots , [ \text{فرزاد} ] , [ \text{فرید} ] , [ \text{رضا} ] \}$$

مثال - همان طور که در حساب و جبر سال قبل دیدید رابطه  $a \equiv b$  (با میزان ۳) در مجموعه اعداد صحیح نسبی  $\mathbb{Z}$  يك رابطه هم‌ارزی است در نتیجه ، این رابطه مجموعه  $\mathbb{Z}$  را به دسته‌های هم‌ارزی زیر افراز می‌کند :

$$[0] = \{ \dots , -6 , -3 , 0 , 3 , 6 , 9 , \dots \}$$

$$[1] = \{ \dots , -5 , -2 , 1 , 4 , 7 , 10 , \dots \}$$

$$[2] = \{ \dots , -4 , -1 , 2 , 5 , 8 , 12 , \dots \}$$

مجموعه‌ای را که از همه این دسته‌های هم‌ارزی تشکیل شده است با  $\mathbb{Z}/\equiv$  نمایش می‌دهند.

$$\mathbb{Z}/\equiv = \{ [0] , [1] , [2] \}$$

### رابطه ترتیب

رابطه « $\leq$ » را در مجموعه اعداد حقیقی زیاد به کار برده‌اید. این رابطه دارای سه خاصیت زیر است :

الف-  $a \leq a$  (خاصیت بازتابی)

ب- اگر  $a \leq b$  و  $b \leq a$  ، آن‌گاه  $a = b$  (خاصیت ؟)

ج- اگر  $a \leq b$  و  $b \leq c$  ، آن‌گاه  $a \leq c$  (خاصیت ترابایی)

رابطه « $\leq$ » دارای خواص بازتابی و ترابایی بوده ولی به جای خاصیت تقارنی دارای خاصیت دیگری است که هنوز اسمی برای آن نمی‌دانید .

رابطه زیرمجموعه بودن « $\subset$ » را در خانواده مجموعه‌ها در نظر بگیرید ، این رابطه نیز دارای همان سه خاصیت است .

الف-  $A \subset A$  (خاصیت بازتابی)

ب- اگر  $A \subset B$  و  $B \subset A$  ، آن‌گاه  $A = B$  . (خاصیت ؟)

ج- اگر  $A \subset B$  و  $B \subset C$  ، آن‌گاه  $A \subset C$  . (خاصیت ترابایی)

رابطه « $\subset$ » هم دارای خواص بازتابی و ترابایی بوده ولی به جای خاصیت تقارنی دارای خاصیت دیگری است . رابطه « $\leq$ » در مجموعه اعداد حقیقی و رابطه « $\subset$ » در مجموعه‌ها مثالهایی از رابطه ترتیب می‌باشند .

تعریف - فرض کنیم رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A$  تعریف شده باشد. يك رابطه ترتیب داد نامیده میشود هرگاه :

الف - دارای خاصیت بازتابی باشد . یعنی

$$\forall a \in A, (a, a) \in \mathcal{R}$$

ب - داشته باشیم :

$$\forall a, b \in A, ((a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, a) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (a = b)$$

ج -  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت ترایایی باشد:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, c) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (a, c) \in \mathcal{R}$$

خاصیت «ب» خاصیت پاد تقارنی رابطه  $\mathcal{R}$  در  $A$  نامیده می شود. پس :

رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A$  دارای خاصیت پاد تقارنی است هرگاه :

$$\forall a, b \in A, ((a, b) \in \mathcal{R} \wedge (b, a) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (a = b)$$

بنابراین رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A$  يك رابطه ترتیب است هرگاه دارای سه خاصیت بازتابی،

پاد تقارنی و ترایایی باشد .

مثال - رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A = \{ ۱, ۲, ۳ \}$  به صورت زیر تعریف شده است :

$$\mathcal{R} = \{ (۱, ۲), (۱, ۱), (۲, ۲), (۳, ۳) \}$$

آیا  $\mathcal{R}$  يك رابطه ترتیب است ؟

حل: الف- هر عضو  $A$  با خودش بوسیله رابطه  $\mathcal{R}$  مربوط است پس  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت

بازتابی است .

ب -  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت پاد تقارن است. زیرا، گزاره شرطی زیر که مؤلفه اول آن (سمت

چپ آن) نادرست است ، درست می باشد :

$$((۱, ۲)) \in \mathcal{R} \wedge (۲, ۱) \in \mathcal{R} \Rightarrow ۱ = ۲$$

ج -  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت ترایایی است. زیرا، گزاره شرطی زیر که هر دو مؤلفه اش درست

است درست می باشد :

$$((۱, ۲) \in \mathcal{R} \wedge (۲, ۲) \in \mathcal{R}) \Rightarrow (۱, ۲) \in \mathcal{R}$$

رابطه  $\mathcal{R}$  دارای سه خاصیت بازتابی ، پاد تقارن و ترایایی بوده در نتیجه يك رابطه

ترتیب است .

## تمرین

۱- رابطه  $\mathcal{R} = \{ (۱, ۱), (۱, ۳), (۲, ۲), (۳, ۱), (۳, ۳) \}$  در مجموعه



$A = \{1, 2, 3, 4\}$  تعریف شده است. آیا  $\mathcal{R}$  دارای خاصیت بازتابی است ؟  
 ۲- هریک از رابطه‌های زیر در مجموعه  $E = \{1, 2, 3\}$  تعریف شده است. تحقیق کنید کدام یک از آنها دارای خاصیت بازتابی، تقارنی و یا ترایایی است .

$$\mathcal{R}_1 = \{ (1,2), (3,2), (2,2), (2,3) \} ; \mathcal{R}_2 = \{ (1,2), (2,3), (1,3) \}$$

$$\mathcal{R}_3 = \{ (1,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3) \} ; \mathcal{R}_4 = \{ (1,2) \}$$

$\mathcal{R}_5 = \{ (1,1), (2,1), (2,2), (3,2), (2,3) \} ; \mathcal{R}_6 = \{ (1,1), (3,2), (2,3) \}$   
 ۳- هریک از رابطه‌های زیر در مجموعه اعداد طبیعی تعریف شده است. تحقیق کنید کدام یک از آنها خاصیت بازتابی یا تقارنی دارد .

«  $x$  کوچکتر یا مساوی  $y$  است » ؛ «  $x$  مقسوم علیه  $y$  است » ؛ «  $x$  و  $y$  نسبت به هم اولند » .

۴- رابطه‌ای مثل  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $E = \{1, 2, 3\}$  بنویسید که نه خاصیت تقارنی و نه خاصیت بازتابی داشته باشد .

۵- رابطه « عمود بودن » در مجموعه خطوط صفحه دارای کدام یک از خواص بازتابی تقارنی یا ترایایی است .

۶- هرگاه رابطه‌های  $\mathcal{R}$  و  $\mathcal{R}'$  در یک مجموعه دارای خاصیت تقارنی باشند آیا  $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}'$  نیز در آن مجموعه دارای این خاصیت است ؟

۷- هرگاه رابطه‌های  $\mathcal{R}$  و  $\mathcal{R}'$  در یک مجموعه دارای خاصیت ترایایی باشند آیا  $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}'$  یا  $\mathcal{R} \cup \mathcal{R}'$  نیز در آن مجموعه دارای این خاصیت است .

۸- اگر رابطه‌های  $\mathcal{R}$  و  $\mathcal{R}'$  در یک مجموعه دارای خاصیت بازتابی باشند آیا  $\mathcal{R} \cup \mathcal{R}'$  یا  $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}'$  نیز در آن مجموعه دارای این خاصیت است ؟

۹- مجموعه  $A = \{a, b, c\}$  داده شده است رابطه‌ای در  $A$  بنویسید که : الف - خاصیت تقارنی داشته و خاصیت ترایایی نداشته باشد. ب - خاصیت ترایایی داشته و خاصیت تقارنی نداشته باشد. ج - فقط خاصیت بازتابی داشته باشد. د - خاصیت بازتابی و تقارنی داشته ولی خاصیت ترایایی نداشته باشد .

۱۰- رابطه  $a \mathcal{R} b$  در مجموعه اعداد طبیعی به این معنی است که  $a$  و  $b$  دارای یک مقسوم علیه مشترک غیر از یک می‌باشند. آیا  $\mathcal{R}$  یک رابطه هم‌ارزی است ؟

۱۱- آیا رابطه « هم‌مساحت بودن » در مجموعه چند ضلعیهای داخل صفحه یک رابطه هم‌ارزی است ؟

۱۲- هریک از روابط زیر در مجموعه  $A = \{1, 2, 3\}$  تعریف شده است :

$$\mathcal{R}_1 = \{ (1,1) \} , \mathcal{R}_2 = \{ (1,2) \} , \mathcal{R}_3 = \{ (1,1), (2,3), (3,2) \}$$

تحقیق کنید کدام از آنها دارای خاصیت پاد تقارن می باشد .

۱۳- اگر  $\mathcal{R}$  و  $\mathcal{R}'$  تعریف شده در مجموعه  $A$  دارای خاصیت پاد تقارن باشند، آیا  $\mathcal{R} \cup \mathcal{R}'$

با  $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}'$  در  $A$  نیز دارای این خاصیت می باشد ؟

۱۴- رابطه «  $x$  بر  $y$  تقسیم پذیر است » در مجموعه  $A = \{ ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ \}$  تعریف

شده است . آیا این رابطه يك رابطه ترتیب است ؟

۱۵- رابطه  $\mathcal{R}$  در مجموعه  $A = \{ ۰، ۱، ۲، ۳ \}$  به صورت زیر تعریف شده است :

$$\mathcal{R} = \{ (۰، ۰)، (۰، ۱)، (۱، ۰)، (۱، ۲)، (۲، ۲)، (۰، ۲)، (۲، ۰) \}$$

آیا  $\mathcal{R}$  يك رابطه ترتیب است ؟

## تابع

تابع - فرض کنید شما درجه تب يك مریض را در بعضی از ساعات روز اول بهمن يك سال

معین اندازه گرفته آن را در يك جدول به صورت زیر یادداشت کرده اید :

ساعات	۸	۱۰	۱۲	۱۴	۱۶
درجه تب	۳۶/۵	۳۷/۲	۳۷/۵	۳۷/۶	۳۷/۸

$$\mathcal{R} = \{ (۸، ۳۶/۵)، (۱۰، ۳۷/۲)، (۱۲، ۳۷/۵)، (۱۴، ۳۷/۶)، (۱۶، ۳۷/۸) \}$$

روشن است که مریض در يك ساعت معین

روز دارای دو درجه تب متفاوت نیست به

عبارت دیگر ، هیچ دو زوج مرتب متفاوتی

از رابطه  $\mathcal{R}$  دارای مؤلفه های اول برابر

نیستند .

رابطه  $\mathcal{R}_1$  از مجموعه کشورها در مجموعه

بایستختهای آنها به صورت زیر تعریف شده است :


$\mathcal{R}_1$  نیز رابطه ای است که در آن هیچ دو زوج

مرتب متفاوتی دارای مؤلفه های اول برابر نیستند . زیرا ، هیچ کشوری در يك زمان معین

دارای دو پایتخت نیست :


$$\mathcal{R}_1 = \{ (تهران، ایران)، (لندن، انگلستان)، (پاریس، فرانسه)، (آنکارا، ترکیه) \}$$

در ریاضیات به طور فراوان باروابتی از این قبیل که در آنها هیچ دو زوج متفاوتی دارای



عضوهای اول برابر نیستند برمی‌خوریم. این نوع روابط در ریاضیات و سایر علوم اهمیت خاص داشته به آنها تابع می‌گوییم.

يك رابطه که در آن هیچ دو زوج مرتب متفاوتی دارای مؤلفه‌های اول مساوی نباشند يك تابع نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، يك رابطه که در آن به هر عضو دامنه، عضو منحصر به فردی از برد نسبت داده می‌شود يك تابع است.



مثال ۱ - رابطه  $R$  طبق نمودار روبه‌رو

تعریف شده است آیا  $R$  يك تابع است ؟

حل : رابطه فوق‌را به صورت زوجهای

مرتب می‌نویسیم :

$$R = \{ (1, p), (2, q), (2, s), (2, 1) \}$$

در این رابطه چون دو زوج مرتب  $(2, q)$  و  $(2, s)$  دارای مؤلفه‌های اول برابر

می‌باشند (در نمودار از عضو ۲ دو پیکان خارج شده است.) لذا  $R$  يك تابع نیست.

مثال ۲ - رابطه  $R$  طبق نمودار روبه‌رو

تعریف شده است. آیا  $R$  يك تابع است ؟

حل : رابطه  $R$  را به صورت زوجهای

مرتب می‌نویسیم.

$$R = \{ (a, 1), (b, 1), (c, 2), (d, 2), (e, 3) \}$$

در اینجا هیچ دو زوج مرتبی دارای مؤلفه‌های

اول مساوی نیستند. (در نمودار از هر عضو  $A$

فقط يك پیکان خارج شده است.) لذا  $R$  يك تابع است. در  $R$  زوجهای  $(a, 1)$ ،  $(b, 1)$  دارای مؤلفه‌های دوم مساوی هستند با وجود این  $R$  يك تابع است. یعنی در يك تابع ممکن است زوجهای مرتبی وجود داشته باشند که دارای مؤلفه‌های دوم مساوی باشند. از نظر نمودار پیکانی، تابع رابطه‌ای است که از هر عضو دامنه آن يك و تنها يك پیکان خارج شده باشد.

مثال ۳ - مطلوب است رسم نمودار مختصاتی رابطه زیر و بیان آن که آیا این رابطه يك

تابع است یا نه ؟

$$R = \{ (-2, 0), (1, -1), (1, 3) \}$$


حل : هرگاه نقاط نظیر زوجهای این رابطه را روی صفحه مختصات تعیین کنیم، شکل

زیر به دست می‌آید :

در اینجا زوجهای مرتب  $(1, -1)$  و  $(1, 3)$  دارای مؤلفه‌های اول برابر هستند. لذا  $R$

يك تابع نیست. همچنین در شکل می‌بینید که نمودار این دو زوج مرتب روی خطی موازی

با محور  $y$ ها قرار گرفته اند .




مثال ۴ - مطلوب است رسم نمودار مختصاتی رابطه زیر و بیان آن که آیا این رابطه یک

تابع است یا نه ؟

$$\mathcal{G} = \{ (-2, 0), (1, 1), (2, 3), (3, 2) \}$$

حل: نمودار این رابطه در زیر رسم شده است. در این رابطه هیچ دوزوج مرتبی دارای



عضوهای اول برابر نیستند. به عبارت دیگر، هیچ دوتقطه‌ای نمودار این رابطه روی يك خط موازی با محور  $y$ ها قرار نگرفته است. لذا  $\varnothing$  يك تابع می‌باشد.

از نظر نمودار مختصاتی، تابع رابطه‌ای است که هیچ دوتقطه‌ای از نمودار آن روی يك خط موازی محور  $y$ ها قرار نگرفته باشد.

## دامنه و برد يك تابع

تعریف - فرض کنیم  $f$  تابعی از  $A$  در  $B$  باشد. مجموعه

$$\{x \in A \mid (x, y) \in f\}$$

« دامنه » تابع  $f$  نامیده شده و با  $D_f$  نشان داده میشود. همچنین مجموعه


$$\{y \in B \mid (x, y) \in f\}$$

« برد » تابع  $f$  نامیده شده و با  $R_f$  نشان داده میشود.

بالاخره مجموعه  $B$ ، « هم دامنه » (و یا حوزه) تابع  $f$  نامیده میشود.

اگر  $f$  تابعی از  $A$  در  $B$  بوده و  $D_f = A$ ، گوئیم  $f$  تابعی «ی» از  $A$  در  $B$  است.

هرگاه دامنه و هم دامنه تابع  $f$  مجموعه  $A$  باشد، در اینصورت گفته میشود که تابع  $f$  در  $A$  تعریف شده است.



مثال ۱- تابع  $f$  از مجموعه  $A = \{1, 2, 3\}$

در مجموعه  $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  با نمودار

رو به رو تعریف شده است:

در اینجا  $A$  و  $B$  به ترتیب دامنه و

حوزه  $f$  بوده همان‌طور که در نمودار آن می‌بینید

از هر عضو  $A$  يك پیکان خارج شده است در

صورتی که به هر عضو  $B$  پیکان منتهی نشده است. همچنین برد  $f$  مجموعه  $\{2, 3, 4, 6\}$  میباشد.

مثال ۲ - نقطه ثابت  $O$  را در صفحه در نظر گرفته به هر نقطه  $P$  از این صفحه نقطه  $P'$  را

به صورت زیر نسبت می‌دهیم:


نقطه  $P'$  از دوران  $P$  حول نقطه  $O$

در خلاف جهت حرکت عقربه ساعت

و به اندازه  $90^\circ$  به دست می‌آید:

بدین ترتیب يك تابع به دست می‌آید


که دامنه و حوزه آن مجموعه همه نقاط صفحه است.



یادآوری - از این پس برای نامگذاری تابع از حرفهای  $f, g, h, \dots$  استفاده می‌کنیم.

## قانون و نمایش تابع

تابع  $f$  از مجموعه  $A$  در مجموعه  $B$  طبق نمودار زیر تعریف شده است:



در این نمودار عضو ۲ از دامنه بایک پیکان به عضو ۶ از حوزه مربوط شده است. در اینجا گفته می‌شود تابع  $f$  عضو ۲ را روی ۶ تصویر کرده است. این مطلب را به یکی از دو صورت زیر نمایش می‌دهند:

$$2 \xrightarrow{f} 6$$

$$f: 2 \rightarrow 6$$

به عدد ۶ مقدار تابع به ازای ۲ نیز می‌گویند. در زیر تصاویر سایر عضوهای  $A$  نوشته شده است.

$$3 \xrightarrow{f} 9$$

$$4 \xrightarrow{f} 12$$

$$5 \xrightarrow{f} 15$$

$$12 \xrightarrow{f} 36$$

هرگاه  $x$  عضو دلخواهی از دامنه باشد به جای نوشتن همه تصاویر فوق می‌توان نوشت:

$$x \xrightarrow{f} 3x \quad (1)$$

در اینجا (۱) را قانون تابع خوانده آن را به صورتهای زیر نیز نمایش می‌دهند:

$$f(x) = 3x$$

$$y = 3x$$

$$y = f(x) = 3x$$

از آنچه گفته شد نتیجه می‌شود که هر تابع روی  $A$  در  $B$  از سه قسمت زیر تشکیل شده

است:

الف - مجموعه‌ای  $A$  که به نام دامنه تابع خوانده می‌شود.

ب - مجموعه‌ای  $B$  که به نام حوزه تابع خوانده می‌شود.

ج - قانونی که به هر عضو  $A$  يك و تنها يك عضو از  $B$  را نسبت می دهد . این قانون معمولاً به صورت يك یا چند معادله (گزاره نما) بیان می شود .  
تابع  $f$  را که بدین ترتیب بیان شده است به شکل زیر نمایش می دهند :

$$A \xrightarrow{f} B \quad \text{و} \quad f : A \rightarrow B$$

$$y = f(x) \quad \quad y = f(X)$$

و می خوانند «تابع  $f$  روی مجموعه  $A$  در  $B$  به صورت  $y = f(x)$  تعریف شده است.» در حالت  $A=B$  . می نویسیم :

$$A \xrightarrow{f} A \quad \text{و یا} \quad F : A \rightarrow B$$


$$y = f(x) \quad \quad y = F(X)$$

که خوانده می شود «تابع  $f$  در مجموعه  $A$  به صورت  $y = f(x)$  تعریف شده است .»  
مثال - تابع  $g$  روی مجموعه اعداد درست غیر از صفر در مجموعه اعداد طبیعی به صورت زیر تعریف شده است :

« به هر عضو دامنه مربع آن نسبت داده می شود .»

این تابع را به صورتی که در بالا گفته شد نمایش دهید.

حل : طبق تعریف داده شده تصاویر عضوها در این تابع به صورت زیر است :



$$t \xrightarrow{g} t^2$$

پس نمایش این تابع طبق آنچه گفته شد به صورت زیر خواهد بود .

$$Z \xrightarrow{g} N \quad \text{و یا} \quad g : Z \rightarrow N$$

$$g(t) = t^2 \quad \quad g(t) = t^2$$

باید توجه داشت که حرف  $x$  یا  $x$  نقشی در نمایش قانون يك تابع ندارد و قانون تابع مثال  
 قبل را به صورتهای زیر نیز می توان نمایش داد :

مربع آن عدد  $= g$  ( هر عدد )  $g(z) = z^2$  ;  $g(x) = x^2$  ;  $g(y) = y^2$  ;  
 لاذکر - گاهی اوقات تابع در دامنه داده شده با چند قانون بیان می شود . مثلاً تابع  
 $g$  در مجموعه اعداد حقیقی که به نام تابع نماد معروف است به صورت زیر تعریف می شود .

$$g(x) = \begin{cases} 1 & : x > 0 \\ 0 & : x = 0 \\ -1 & : x < 0 \end{cases}$$

و یا تابع  $|x|$  در مجموعه اعداد حقیقی که به نام قدر مطلق خوانده می شود به صورت زیر  
 تعریف شده است :

$$|x| = \begin{cases} x & : x > 0 \\ 0 & : x = 0 \\ -x & : x < 0 \end{cases}$$

## تعریف

۱- تعیین کنید که از روابط زیر کدامها تابع هستند . دامنه و برد هر کدام را که تابع  
 است بنویسید.

$$\{(3, -4), (3, 4), (0, 0)\} ; \{(5, 6), (7, 4), (0, 0), (2, 4)\}$$

$$\{(2, 6), (4, 6), (6, 6)\} ; \{(a, x), (a, y), (a, z)\}$$

۲- تعیین کنید که از روابط زیر کدامها تابع هستند .


$$\{(x, y) \mid x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z} \text{ و } y^2 = 4x\} ; \{(x, y) \mid x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z} \text{ و } x + y = 5\}$$

$$\{(x, y) \mid x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z} \text{ و } y = \sqrt{x}\} ; \{(x, y) \mid x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z} \text{ و } x < y\}$$


( $\mathbb{Z}$  دامنه هریک از توابع است).



۳- از نمودارهای زیر کدام يك تابع را مشخص می‌سازد :



۴- از نمودارهای زیر کدام يك تابع است :



۵- از جدولهای زیر کدام يك تابع را مشخص می‌سازد :

$x$	-۲	۰	۲	-۵
$y$	-۵	-۱	۳	۲

$x$	-۲	۰	-۲
$y$	-۸	-۲	۲

$x$	-۴	-۳	-۱
$y$	۶	۰	۰

۶- تابعی به صورت زیر تعریف شده است :

$$\left\{ (x, y) \mid x \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \text{ و } y = \frac{x}{2} - 5 \right\}$$

این تابع را به صورت زوجهای مرتب نشان دهید .

۷- دو تابع  $f$  و  $g$  به صورتهای زیر تعریف شده‌اند :

$$f = \{ (1, 1), (2, 2) \} ; g = \{ (1, 2), (3, 4) \}$$

آیا  $f \cup g$  یا  $f \cap g$  نیز تابع هستند ؟ آیا این مطلب در حالت کلی نیز درست است ؟

۸- تابع  $f$  در مجموعه  $Z_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$  به صورت زیر تعریف شده‌است :

$$\{ (0, 0), (1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 12), (5, 15), \dots \}$$

قانون تابع را بنویسید .

۹- نمودار مختصاتی تابع زیر را رسم کنید :

$$g = \{ (x, y) \mid x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\} \text{ و } y = x^2 \}$$

۱۰- مطلوب است نمایش هریک از توابع زیر :

الف - تابع  $f$  به هر عدد حقیقی ، مکعب آن عدد را نسبت می دهد .

ب - تابع  $g$  به هر عدد حقیقی ، عدد ثابت ۵ را نسبت می دهد .

ج - تابع  $h$  به هر عدد حقیقی مثبت ، مربع آن و به هر عدد حقیقی منفی ، عدد ثابت  $p$  و به صفر ، عدد صفر را نسبت می دهد .

۱۱- تابع  $f$  در مجموعه اعداد حقیقی به صورت زیر تعریف شده است :

$$f(x) = \begin{cases} 3x-1 & : x > 3 \\ x^2-3 & : x = 3 \\ 2x+3 & : x < 3 \end{cases}$$

مطلوب است محاسبه  $f(5)$  ،  $f(-3)$  ،  $f(2)$  ،  $f(1)$  ،  $f(0)$  .

تعریف - تابع  $f: A \rightarrow B$  پوششی نامیده می شود . هرگاه داشته باشیم  $R_f = B$  .  
به عبارت دیگر ، تابع  $f$  پوششی است هرگاه برای هر  $y$  متعلق به  $B$  عضوی مانند  $x$  متعلق به  $A$  وجود داشته باشد به قسمی که  $f(x) = y$  .

$$\forall y \in B, (\exists x \in A, f(x) = y)$$

مثال - تابع  $g$  در مجموعه اعداد درست با قانون زیر تعریف شده است :

$$g(x) = x^2$$

آیا  $g$  یک تابع پوششی است ؟

حل - در این تابع ، به هر عدد درست مربع آن

نسبت داده می شود . بنابراین اگر  $y$  یک عدد درست

نامنفی باشد (مانند  $-2$ ) ، هیچ عدد درستی مانند  $x$

وجود ندارد به طوری که  $y = x^2$  . بنابراین  $g$  یک تابع پوششی نیست .

تعریف - تابع  $g: A \rightarrow B$  :  $g$  دایک به یک خوانند هرگاه اگر  $x$  و  $x'$  دو عضو متمایز از  $A$  باشند ،

آنگاه  $g(x)$  و  $g(x')$  نیز دو عضو متمایز در  $B$  باشند . به عبارت دیگر ،  $g$  یک تابع یک به یک

است هرگاه برای هر  $x$  و  $x'$  متعلق به  $A$  داشته باشیم :

۱ - تابع پوششی را « تابع بر روی » نیز گفته اند .

$$(x \neq x') \Rightarrow g(x) \neq g(x')$$

به عنوان يك تمرين نشان دهيد كه تابع  $g: A \rightarrow B$  يك - به - يك است اگر و تنها اگر برای هر  $x$  و  $x'$  متعلق به  $A$  داشته باشیم :


$$g(x) = g(x') \Rightarrow x = x'$$

مثال - تابع  $g$  از مجموعه  $A = \{1, 2, 3\}$  در مجموعه  $B = \{a, b, c, d\}$

به صورت زیر تعریف شده است :

$$g(1) = a ; g(2) = b ; g(3) = c$$

آیا  $g$  يك تابع يك به يك است ؟




تعریف - تابع  $h: A \rightarrow B$  را يك به يك و پوششی گویند هرگاه  $h$  هم يك به يك و هم پوششی باشد .

تابع يك به يك و پوششی را يك گسترش دوسویی دیا يك فضاظر يك به يك نیز می نامند .  
مثال ۱- تابع  $h$  در مجموعه عددهای درست به صورت زیر تعریف شده است :

$$h: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$h(x) = -x$$



آیا  $h$  يك تابع يك به يك و پوششی است ؟

حل: الف -  $h$  تابعی است يك - به - يك زیرا

برای هر  $x$  و  $x'$  متعلق به  $\mathbb{Z}$  داریم :

$$x \neq x' \Rightarrow -x \neq -x' \Rightarrow g(x) \neq g(x')$$

ب -  $h$  تابعی است پوششی زیرا اگر  $x$  يك عدد

درست باشد، پس  $h(-x) = x$  که در آن  $-x$  نیز يك

عدد درست است .

مثال ۲ - تابع  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  را به صورت زیر تعریف می کنیم :

$$f(x) = 3x + 1$$

نشان دهید که  $f$  يك تابع يك به يك و پوششی است .

حل : باید نشان دهیم که تابع  $f$  هم يك به يك و هم پوششی می باشد .

الف -  $f$  تابعی يك به يك است هرگاه برای هر  $x$  و  $x'$  متعلق به  $R$  داشته باشیم :

$$f(x) = f(x') \Rightarrow (x = x') \quad (1)$$

اما اگر  $f(x) = f(x')$  داریم :

$$3x + 1 = 3x' + 1$$

$$\therefore 3x = 3x'$$

$$\therefore x = x'$$

قانون حذف :

قانون حذف :

یعنی مقدم و تالی گزاره شرطی (1) درست بوده در نتیجه گزاره درست است و تابع يك به يك می باشد .

ب -  $f$  تابعی پوششی است هرگاه برای هر عدد حقیقی  $y$  ، يك عدد حقیقی  $x$  وجود داشته باشد به قسمی که :

$$f(x) = y$$


$$\therefore 3x + 1 = y$$

$$\therefore x = \frac{y-1}{3}$$

و چون  $x$  همیشه دارای جواب است پس  $f$  پوششی است .

### تابع یکسان

تابع  $f$  در مجموعه  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  به صورت زیر تعریف شده است :




در این تابع به هر عضو مجموعه  $A$  خود آن عضو نسبت داده شده است . تابع  $f$  مثالی از يك تابع یکسان است .

تعریف - تابع  $f : A \rightarrow A$  یکسان نامیده می شود، هرگاه قانون تابع به صورت زیر بیان شده باشد :


$$f(x) = x$$

واضح است که تابع یکسان يك به يك و پوششی می باشد .



### تابع ثابت

تابع  $g$  طبق نمودار رو به رو تعریف شده است :  
ملاحظه میکنیم که برد این تابع فقط شامل عضو 4




می باشد.  $g$  مثالی از يك تابع ثابت است.  
تعریف - تابع  $A \rightarrow B : g$  ثابت نامیده می شود  
هرگاه برد  $g$  تنها شامل يك عنصر باشد.

### تابع وارون (معکوس)

تابع  $f$  که با نمودار روبه رو تعریف شده است

يك به يك و پوششی می باشد.

از تغییر جهت پیکانها در این نمودار تابع دیگری  
مثل  $g$  به دست می آید که به نام تابع وارون  $f$  نامیده  
می شود. همچنین توابع  $g$  و  $f$  وارون یکدیگر نامیده  
می شوند.



اگر تابع  $f$  يك به يك و پوششی نباشد در این

صورت وارون نخواهد داشت.

تعریف - اگر تابع  $A \rightarrow B : f$  يك به يك و پوششی باشد. از تغییر جهت پیکانها در نمودار

پیکانی آن تابعی مثل  $g$  به صورت زیر به دست می آید:

$$g : B \rightarrow A$$

که تابع وارون  $f$  نامیده می شود. بنابراین  $f$  و  $g$  وارون یکدیگر می باشند هرگاه:

$$\forall a \in A \text{ و } \forall b \in B, (f(a) = b \iff g(b) = a)$$

مثال - دو تابع  $f$  و  $g$  به صورتهای زیر داده شده اند:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = 2x - \frac{5}{2} \quad (1)$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2} \quad (2)$$

آیا  $f$  و  $g$  وارون یکدیگرند؟

حل: طبق تعریف باید نشان دهیم که:

$$\forall a \text{ و } b \in \mathbb{R}, (f(a) = b \iff g(b) = a)$$

اینجا يك گزاره دوشرطی داریم. بنا بر این اثبات شامل دو قسمت خواهد بود:

الف - فرض کنید  $f(a) = b$ . طبق (1) داریم:

$$f(a) = b = 2a - \frac{5}{2} \quad (3)$$

نشان دهید که  $f$  يك تابع يك به يك و پوششی است .

حل : باید نشان دهیم که تابع  $f$  هم يك به يك و هم پوششی می باشد .

الف-  $f$  تابعی يك به يك است هرگاه برای هر  $x$  و  $x'$  متعلق به  $R$  داشته باشیم :

$$f(x) = f(x') \Rightarrow (x = x') \quad (1)$$

اما اگر  $f(x) = f(x')$  داریم :

$$3x + 1 = 3x' + 1$$

$$\therefore 3x = 3x'$$

$$\therefore x = x'$$

قانون حذف :

قانون حذف :

یعنی مقدم و تالی گزاره شرطی (1) درست بوده در نتیجه گزاره درست است و تابع يك به يك می باشد .

ب-  $f$  تابعی پوششی است هرگاه برای هر عدد حقیقی  $y$  ، يك عدد حقیقی  $x$  وجود داشته باشد به قسمی که :

$$f(x) = y$$


$$\therefore 3x + 1 = y$$

$$\therefore x = \frac{y-1}{3}$$

و چون  $x$  همیشه دارای جواب است پس  $f$  پوششی است .

### تابع یکسان

تابع  $f$  در مجموعه  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  به صورت زیر تعریف شده است :



در این تابع به هر عضو مجموعه  $A$  خود آن عضو نسبت داده شده است . تابع  $f$  مثالی از يك تابع یکسان است .


تعریف - تابع  $f : A \rightarrow A$  یکسان نامیده می شود، هرگاه قانون تابع به صورت زیر بیان شده باشد :


$$f(x) = x$$

واضح است که تابع یکسان يك به يك و پوششی می باشد .

### تابع ثابت

تابع  $g$  طبق نمودار رو به رو تعریف شده است :  
ملاحظه میکنیم که برد این تابع فقط شامل عضو  $p$






می باشد.  $g$  مثالی از يك تابع ثابت است .  
تعریف - تابع  $A \rightarrow B$  :  $g$  ثابت نامیده می شود  
هرگاه برد  $g$  تنها شامل يك عنصر باشد .

### تابع وارون ( معکوس )

تابع  $f$  که با نمودار روبه رو تعریف شده است  
يك به يك و پوششی می باشد .



از تغییر جهت پیکانها در این نمودار تابع دیگری  
مثل  $g$  به دست می آید که به نام تابع وارون  $f$  نامیده  
می شود. همچنین توابع  $g$  و  $f$  وارون یکدیگر نامیده  
می شوند .

اگر تابع  $f$  يك به يك و پوششی نباشد در این  
صورت وارون نخواهد داشت .

تعریف - اگر تابع  $f : A \rightarrow B$  يك به يك و پوششی باشد. از تغییر جهت پیکانها در نمودار  
پیکانی آن تابعی مثل  $g$  به صورت زیر به دست می آید :

$$g : B \rightarrow A$$

که تابع وارون  $f$  نامیده می شود. بنابراین  $f$  و  $g$  وارون یکدیگر می باشند هرگاه :

$$\forall a \in A \text{ و } \forall b \in B , (f(a) = b \iff g(b) = a)$$

مثال - دو تابع  $f$  و  $g$  به صورتهای زیر داده شده اند :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = 2x - \frac{5}{2} \quad (1)$$

$$g(x) = \frac{1}{2}x + \frac{5}{4} \quad (2)$$

آیا  $f$  و  $g$  وارون یکدیگرند ؟

حل : طبق تعریف باید نشان دهیم که :

$$\forall a \text{ و } b \in \mathbb{R} , (f(a) = b \iff g(b) = a)$$

اینجا يك گزاره دوطرفه داریم . بنا براین اثبات شامل دو قسمت خواهد بود :

الف - فرض کنید  $f(a) = b$  . طبق (1) داریم :

$$f(a) = b = 2a - \frac{5}{2} \quad (3)$$

ولی طبق (۲) مقدار  $g(b)$  برابر است با :

$$g(b) = \frac{1}{4}b + \frac{5}{4}$$

هرگاه در این تساوی به جای  $b$  مقدارش را از (۳) قرار دهیم خواهیم داشت :

$$g(b) = \frac{1}{4} \left( 4a - \frac{5}{4} \right) + \frac{5}{4} \\ = a$$

یعنی :

$$f(a) = b \Rightarrow g(b) = a$$

ب- فرض کنیم  $g(b) = a$ ، طبق (۲) داریم :

$$g(b) = a = \frac{1}{4}b + \frac{5}{4}$$

و یا :

$$b = 4a - \frac{5}{4}$$

از طرفی طبق (۱) داریم :

$$f(a) = 4a - \frac{5}{4} \\ = b$$

یعنی :

$$g(b) = a \Rightarrow f(a) = b$$

یعنی گزاره دوشروطی درست بوده و  $f$  و  $g$  وارون یکدیگرند .

## تمرین

۱- سه مجموعه

$$A = \{ x \mid x \in \mathbb{R}, -1 < x < 1 \}$$

$$B = \{ x \mid x \in \mathbb{R}, 1 < x < 3 \}$$

$$C = \{ x \mid x \in \mathbb{R}, -4 < x < -1 \}$$

داده شده و  $\mathbb{R}$  مجموعه اعداد حقیقی است . توابع  $f$ ،  $g$  و  $h$  در این مجموعه ها به صورتهای



زیر تعریف شده‌اند :

$$f: A \rightarrow R; \quad g: B \rightarrow R; \quad h: C \rightarrow R$$

$$f(x) = x^2; \quad g(x) = x^2; \quad h(x) = x^2$$

تعیین کنید کدام يك از این تابعها يك به يك پابوشی است.

۲- هر يك از تابعهای زیر از مجموعه  $A = \{a, b, c, d, e\}$  در مجموعه

$\{x \mid x \text{ یکی از حروف الفبای لاتین است}\}$  تعریف شده است. تعیین کنید کدام يك از این تابعها يك به يك است.

$$\text{الف- } f(a)=r; \quad f(b)=a; \quad f(c)=s; \quad f(d)=r; \quad f(e)=e$$

$$\text{ب- } g(a)=a; \quad g(b)=b; \quad g(c)=e; \quad g(d)=r; \quad g(e)=s$$

$$\text{ج- } h(a)=z; \quad h(b)=y; \quad h(c)=x; \quad h(d)=y; \quad h(e)=z$$

۳- آیا تابعهای زیر پوشی می‌باشند.

$$f: N \rightarrow N; \quad g: N \rightarrow N$$

$$f(x) = x + 3; \quad g(x) = 3x - 2 \quad (N \text{ مجموعه اعداد طبیعی است})$$

۵- تعیین کنید کدام يك از تابعهای زیر يك به يك است:

$$f: R \rightarrow R; \quad g: R \rightarrow R; \quad h: R \rightarrow R$$

$$f(x) = 3x + 2; \quad g(x) = x^2; \quad h(x) = \sqrt{x}$$

( $R$  مجموعه اعداد حقیقی است)

۷- تابع  $h$  به صورت زیر تعریف شده است :

$$h: R \rightarrow R$$

$$h(x) = |x| \quad (R \text{ مجموعه اعداد حقیقی است})$$

عضوهای دوم زوجهای زیر را بنویسید :

$$(0, h(0)); (2, h(2)); (-3, h(-3)); (-1, h(-1)); \left(-\frac{1}{3}, h\left(-\frac{1}{3}\right)\right)$$

۲- تعیین کنید کدام يك از تابعهای زیر يك به يك و پوشی است.

( $R$  مجموعه اعداد حقیقی است)

$$f: R \rightarrow R; \quad g: R \rightarrow R$$

$$f(x) = x^2 + 3; \quad g(x) = |x| - 2$$

۸- تابعهای  $f$  و  $g$  به صورتهای زیر تعریف شده‌اند:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad ; \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x) = 2x - 3 \quad ; \quad g(x) = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}$$

آیا  $f$  و  $g$  معکوس یکدیگرند؟

۹- تابعهای  $h$  و  $t$  به صورتهای زیر تعریف شده‌اند:

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad ; \quad t: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$h(x) = x^2 \quad ; \quad t(x) = \sqrt{x}$$

آیا  $h$  و  $t$  معکوس یکدیگرند؟

## فصل ۲

### ماتریس

در زندگی روزمره بعضی از ابزارها به حدی موجب آسانی کارها می‌شوند که حتی شاید تصورش نیز برای شما مشکل باشد. اختراع چرخ را در نظر بگیرید ببینید تاچه حد به کار - بردن چرخ نیروی لازم برای کشیدن گاری، درشکه، دوچرخه، ... و ماشین را تقلیل داده است.

در ریاضیات نیز گاهی اوقات نمادها و قراردادهایی به کار برده می‌شود که شبیه چرخ بوده کارها را ساده می‌کند؛ مثلاً در صفحه مختصات به جای این که توضیح داده شود نقطه معین  $A$  دارای طول (خفت)  $a$  و عرض (رُست)  $b$  است به طور ساده می‌نویسند  $A(a, b)$ . با این قرارداد که  $a$  طول (خفت) و  $b$  عرض (رست) نقطه  $A$  است. اکنون هر شخص آشنا به ریاضیات بایک نگاه می‌تواند طول (خفت) و عرض (رست) نقطه  $A$  یا هر نقطه‌ای را که به صورت فوق نوشته شده است بیان کند.

همچنین استفاده از جدول ضرب کار محاسبه و یادگیری ضرب اعداد یک رقمی را ساده کرده است.

X \	۱	۲	۳	...	۹
۱	۱	۲	۳	...	۹
۲	۲	۴	۶	...	۱۸
۳	۳	۶	۹	...	۲۷
...					
۹	۹	۱۸	۲۷	...	۸۱

این نوع قراردادها و جدولها را بعدها به طور فراوان در ریاضیات خواهید دید. در اینجا ما می‌خواهیم یک نوع از این جدولها را که کار بعضی از محاسبات را بسیار ساده کرده است به شما معرفی کنیم. به مثالهای زیر توجه کنید:

مثال ۱ - انبارهای یک شرکت گاز در محلهای  $A$ ،  $B$  و  $C$  قرار گرفته است. فاصله‌های

سه خانه  $K_1$ ،  $K_2$  و  $K_3$  از این انبارها به قرار زیر می باشد :

فاصله A تا خانه $K_1$ :	۵۰ کیلومتر
فاصله A تا خانه $K_2$ :	۳۰
فاصله A تا خانه $K_3$ :	۲۰
فاصله B تا خانه $K_1$ :	۷۰
فاصله B تا خانه $K_2$ :	۵۰
فاصله B تا خانه $K_3$ :	۴۰
فاصله C تا خانه $K_1$ :	۶۰
فاصله C تا خانه $K_2$ :	۲۵
فاصله C تا خانه $K_3$ :	۴۵

این اطلاعات را با استفاده از يك جدول مستطیل شکل که به وسیله کروشه یا پرانتز بسته شده است به صورت زیر نشان می دهیم :

	$K_1$	$K_2$	$K_3$
A	۵۰	۳۰	۲۰
B	۷۰	۵۰	۴۰
C	۶۰	۲۵	۴۵

اکنون با کمک این جدول مستطیل شکل به آسانی فاصله انبار گاز تا هر خانه معین می شود. مثلاً فاصله انبار B از خانه  $K_2$  در محل تلاقی خطوط افقی و قائمی که به ترتیب از B و  $K_2$  رسم می شوند قرار گرفته است . معمولاً از نوشتن حروف نیز خودداری نموده اطلاعات فوق را به صورت زیر نشان می دهیم :

۵۰	۳۰	۲۰
۷۰	۵۰	۴۰
۶۰	۲۵	۴۵

این جدول مستطیل شکل از اعداد مثالی از يك ماتریس است .

مثال ۲ - نتیجه مسابقات چهار تیم فوتبال باشگاههای مختلف تهران در بازیهای فصلی به صورت زیر گزارش شده است :

تیم	مساوی	برد	باخت
تیم A	۱	۲	۶
تیم B	۱	۴	۴

$$\begin{array}{rcl} \text{تیم C} & : & 0 \\ \text{تیم D} & : & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \\ 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 7 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

اطلاعات فوق با استفاده  
از جدول مستطیل شکل به صورت  
رو به رو نشان داده می شود :

این جدول نیز مثالی از یک ماتریس است. در زیر چند ماتریس دیگر نوشته شده که هر کدام ممکن است برای نمایش یک دسته اطلاعات معین به کار برده شوند:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -1 \\ 2 & \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

به طوری که هر جدول مستطیل شکل از اعداد یک ماتریس نامیده می شود .

سطر و ستون یک ماتریس - ماتریس زیر را در نظر بگیرید :

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

هر کدام از اعداد داخل گروه یک عضو ماتریس خوانده می شود. عضوایی که در امتداد یک خط افقی قرار گرفته اند یک سطر ماتریس و عضوایی که در امتداد یک خط قائم واقع شده اند یک ستون ماتریس نامیده می شوند .

$$\begin{array}{c} \text{ستون} \\ \left[ \begin{array}{ccc} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{array} \right] \text{سطر} \end{array}$$

ماتریس فوق دارای ۳ سطر و ۳ ستون است. بالاترین سطر ماتریس را سطر اول و سطرهای زیر آن به ترتیب سطر دوم، سطر سوم، ... خوانده می شوند. همچنین اولین ستون سمت چپ را ستون اول و بقیه از چپ به راست به ترتیب ستون دوم، ستون سوم، ... می باشند.

هر ماتریس که دارای  $m$  سطر و  $n$  ستون باشد، يك ماتریس  $m$  در  $n$  و یا  $m \times n$  نامیده میشود. برای مثال ماتریس زیر يك ماتریس  $3 \times 4$  است.

ستون سوم    ستون دوم    ستون اول

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

سطر اول  
سطر دوم

ماتریس رو به رو که دارای سه سطر و دو ستون است يك ماتریس  $3 \times 2$  است.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}$$

در زیر چند ماتریس دیگر نوشته شده است.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 5 & 7 & 9 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ماتریس  $2 \times 2$     ماتریس  $1 \times 3$     ماتریس  $3 \times 1$     ماتریس  $3 \times 4$

توجه کنید که در يك ماتریس  $m \times n$  عدد درشت  $m$  نمایش تعداد سطرها و عدد درشت  $n$  نمایش تعداد ستونها است.

يك ماتریس  $m \times n$  بصورت زیر میباشد.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ \cdot & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

ماتریس (۱) بصورت  $[a_{ij}]_{m \times n}$  نیز نشان داده میشود.

### ماتریسهای خاص

۱- اگر دريك ماتریس  $m \times n$  داشته باشیم  $m = n$ ، آن گاه يك ماتریس  $n \times n$  خواهیم داشت، چنین ماتریسی که تعداد سطرها و ستونهاى آن مساوى هستند يك ماتریس مربع نامیده می شود

در زیر چند ماتریس مربع نوشته شده است :

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

ماتریس مربع  $2 \times 2$       ماتریس مربع  $3 \times 3$       ماتریس مربع  $4 \times 4$

۲- اگر در یک ماتریس  $m \times n$  داشته باشیم  $m = 1$ ، آن گاه یک ماتریس  $1 \times n$  خواهیم داشت؛ چنین ماتریسی که دارای یک سطر و  $n$  ستون است یک ماتریس سطری نامیده می شود.

در زیر چند ماتریس سطری نوشته شده است :

$$[3 \ 4], [2 \ 5 \ 6], [5 \ 7 \ 8 \ 11], [1 \ 2 \ 3 \dots n]$$

ماتریس سطری  $1 \times n$       ماتریس سطری  $1 \times 4$       ماتریس سطری  $1 \times 3$       ماتریس سطری  $1 \times 2$

در ماتریس سطری  $[5 \ 7 \ 8 \ 11]$ ، عدد ۵ عضو اول، عدد ۷ عضو دوم، عدد ۸ عضو سوم و عدد ۱۱ عضو چهارم این ماتریس نامیده میشود.

۳- اگر در یک ماتریس  $m \times n$  داشته باشیم  $n = 1$ ، در این صورت یک ماتریس  $m \times 1$  خواهیم داشت؛ چنین ماتریسی که دارای  $m$  سطر و یک ستون است یک ماتریس ستونی نامیده می شود.

در زیر چند ماتریس ستونی نوشته شده است :

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 11 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \vdots \\ m \end{bmatrix}$$

ماتریس ستونی  $2 \times 1$       ماتریس ستونی  $3 \times 1$       ماتریس ستونی  $4 \times 1$       ماتریس ستونی  $m \times 1$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

در ماتریس روبه رو، عدد ۳ عضو اول، عدد ۲ عضو دوم، عدد ۱ - عضو سوم و صفر عضو چهارم این ماتریس نامیده می شود.

۴- هر گاه در یک ماتریس  $m \times n$  داشته باشیم  $m = 1$  و  $n = 1$ ، آن گاه یک ماتریس  $1 \times 1$  به دست می آید بنابراین قرارداد چنین ماتریسی مساوی عدد داخل کروشه

گرفته می شود :

$$\begin{bmatrix} ۳ \end{bmatrix}_{1 \times 1} = ۳ , \quad \begin{bmatrix} ۲ \end{bmatrix}_{1 \times 1} = ۲$$

ماتریسها را معمولا با حروف بزرگ الفبا : A ، B ، C ، ... نمایش می دهند .

بطور کلی يك ماتریس  $n \times ۱$  بصورت زیر است :

$$[a_{۱۱} \ a_{۱۲} \ \dots \ a_{۱n}] \quad (۲)$$

$a_{۱۱}$  عضو اول ،  $a_{۱۲}$  عضو دوم و ... و بالاخره  $a_{۱n}$  عضو  $n$  ام ماتریس (۲) نامیده می شود.

همچنین يك ماتریس  $m \times ۱$  بصورت زیر است


$$\begin{bmatrix} b_{۱۱} \\ b_{۲۱} \\ \vdots \\ b_{m۱} \end{bmatrix} \quad (۳)$$

$b_{۱۱}$  عضو اول ،  $a_{۱۲}$  عضو دوم و ... و بالاخره  $b_{m۱}$  عضو  $m$  ام ماتریس (۳) نامیده می شوند.

### عضو عمومی يك ماتریس

فرض کنیم A يك ماتریس  $m \times n$  باشد عضوی از این ماتریس که در سطر دوم و ستون سوم


قرار گرفته است با  $a_{۲۳}$  نمایش می دهند. (۲۳ اندیس حرف a نامیده می شود.) عدد سمت چپ



اندیس، نمایش ترتیب سطرها و عدد سمت راست نماینده ترتیب ستونی است که آن عضو در آنها قرار


گرفته است. به همین ترتیب  $b_{۵۳}$  عضوی است که در سطر پنجم و ستون سوم قرار گرفته است:





در حالت کلی عضوی از ماتریس را که در سطر  $i$ ام و ستون  $j$ ام ( $i$  و  $j$  اعداد طبیعی هستند) قرار گرفته است عضو عمومی ماتریس نامیده و با  $a_{ij}$  نمایش می‌دهیم. گفتیم که ماتریس موارد استعمال فراوان دارد. در زیر ضمن دو مثال کاربرد دیگری از ماتریس آمده است.

**مثال ۱ -** شکل زیر چهار شهر  $A$ ،  $B$ ،  $C$  و  $D$  و جاده‌های بین آنها را نشان می‌دهد. از شهر  $A$  سه جاده شروع شده که هر کدام به یکی از شهرهای  $B$ ،  $C$  و  $D$  می‌رود. از شهر  $B$



نیز سه جاده شروع شده که یکی به  $A$  و دو جاده دیگر به  $C$  می‌رود. به همین ترتیب از هر شهر جاده‌هایی شروع و به شهرهای دیگر منتهی شده است.

در اینجا منظور از جاده بین دو شهر جاده‌ای است که مستقیماً و بدون واسطه آن دو شهر را به هم مربوط می‌سازد. مثلاً بین  $B$  و  $C$  دو جاده بدون واسطه یا به طور ساده دو جاده وجود دارد و لسی بین  $B$  و  $D$  جاده بدون واسطه یا به طور ساده وجود ندارد. طبق قرارداد هرگاه بین دو شهر جاده وجود

نداشته باشد جاده آنها را صفر انتخاب می‌کنند. همچنین جاده هر شهر به خودش را نیز صفر می‌گیرند. با این قرارداد و استفاده از ماتریسها جاده‌های بین شهرهای  $A$ ،  $B$ ،  $C$  و  $D$  به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

	A	B	C	D
A	0	1	1	1
B	1	0	2	0
C	1	2	0	2
D	1	0	2	0

این ماتریس به نام ماتریس شبکه<sup>۱</sup> مستقیم خوانده می‌شود. برعکس با در دست داشتن ماتریس شبکه مستقیم بین چند شهر می‌توان آن شبکه را رسم کرد.

مثال ۲ - ماتریس شبکه مستقیم بین شهرهای H، C، D، P به صورت زیر نمایش داده


شده است :

$$\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{C} \\ \text{D} \\ \text{P} \end{array} \begin{bmatrix} \text{H} & \text{C} & \text{D} & \text{P} \\ \begin{matrix} \circ & 1 & \circ & \circ \\ 1 & \circ & 1 & 1 \\ \circ & 1 & \circ & 2 \\ \circ & 1 & 2 & \circ \end{matrix} \end{bmatrix}$$

شبکه آن را رسم کنید :

با توجه به قراردادهایی که در این زمینه شده است ، شبکه این ماتریس به صورت زیر

خواهد بود :



۱- شبکه مجموعه‌ای از قوسها (یا پاره خطها) است به قسمی که این قوسها (یا پاره خطها) فقط در انتهای خود با یکدیگر مشترك باشند. هر قوس (یا پاره خط) را یال شبکه و هر انتهای آنها را رأس شبکه می‌گویند. رأس شبکه را گره نیز می‌گویند. هر يك از شكلهای بالا يك شبکه است.

## کمرین

۱- دایره آمار يك سازمان اطلاعات مربوط به تحصیلات کارمندان و مستخدمین سازمان را به صورت زیر گزارش داده است :

میزان تحصیلات						افراد
فوق لیسانس	لیسانس	فوق دیپلم	دیپلم	پنج ابتدایی	کمتر از پنج ابتدایی	
۵/۴	۴/۵	۳۲/۷	۴۹/۸	۱۲/۶	۰	مسئولین قسمتها
۷/۱	۲۵	۴۵	۲۱/۵	۱/۴	۰	تکنسینها و متخصصین
۰/۱	۰/۶	۲۰/۴	۷۳/۳	۵/۵	۰/۱	منشیها و کارمندان دفتری
						فروشندهگان و کارکنان
۰	۰	۰	۳۴/۳۵	۵۷	۸/۴۵	شرکت تعاونی
						مأمورین تلفنخانه و
۰	۰	۰	۳/۱	۳۹/۹	۵۷	رانندگان
۰	۰	۰	۰	۵۲/۵	۳۷/۵	خدمتگزاران

الف - اطلاعات فوق را به صورت يك ماتریس نشان دهید. ب - تعداد سطرها و ستونهای این ماتریس را معین کنید .

۲- در جدول زیر بعضی از مشخصات جغرافیایی پنج قاره عالم نوشته شده است :

مشخصات	مساحت بر حسب کیلومتر مربع	جمعیت	بلندترین ارتفاع بر حسب متر
قاره			
آسیا	۴۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۹۰,۰۰۰	۷,۸۴۸ متر
افریقا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵
امریکا	۴۱,۹۸۰,۰۰۰	۳۸۲,۷۲۰,۰۰۰	۶,۹۵۹
اروپا	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰
اقیانوسیه	۸,۹۶۵,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰

اطلاعات این جدول را به صورت يك ماتریس نمایش دهید .

به صورت  $m \times n$  بیان کنید .

۳- يك ماتريس  $3 \times 4$  بنويسيد كه عضوهای آن حروف الفباي لاتين باشد .

۴- ماتريس رو به رو داده شده است ،  
 عضوهای زیر را مشخص سازيد :


$$\begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ & ۵ & ۱۱ \\ ۴ & ۵ & ۶ & ۹ & ۱ \\ ۱ & ۷ & ۰ & ۲ & ۳ \end{bmatrix}$$

$$a_{۳۲} , a_{۲۵} , a_{۱۴} , a_{۱۱} , a_{۲۵} , a_{۲۴}$$

۵- در ماتريس رو به رو به جای « ؟ » عضو مناسب به صورت  $a_{ij}$  بگذاريد :

$$\begin{bmatrix} a_{۱۱} & ? & ? & a_{۱۴} \\ a_{۲۱} & ? & ? & ? \\ ? & ? & a_{۳۳} & ? \end{bmatrix}$$

۶- در زیر چند شبکه مستقيم رسم شده است .  
 ماتريسهای هريك را بنويسيد :



۷- در زیر ماتريس چند شبکه مستقيم نوشته شده است ، شبکه مربوط به هريك را جداگانه

رسم كنيد :

$$\begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۰ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۲ & ۲ \\ ۰ & ۲ & ۰ & ۲ \\ ۰ & ۲ & ۲ & ۰ \end{bmatrix}$$

۸- ماتريس  $3 \times 3$  بنويسيد كه همه عضوهای آن صفر باشد . چه اسمي برای اين ماتريس

پيشنهاده می كنيد ؟

تساوی دو ماتريس

اگر

ستون  $i$  ام

$$A = \begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۲} & \dots & a_{۱n} \\ a_{۲۱} & a_{۲۲} & \dots & a_{۲n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dots & \dots & a_{ij} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m۱} & a_{m۲} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

سطر  $j$  ام

ستون  $j$  ام

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{سطر } i \text{ ام}$$

دوماتریس  $m \times n$  باشند،  $a_{ij}$  و  $b_{ij}$  ( $i = 1, 2, \dots, m$  و  $j = 1, 2, \dots, n$ ) عناصر متناظر دوماتریس  $A$  و  $B$  نامیده میشوند. برای مثال  $a_{22}$  و  $b_{22}$  دو عنصر متناظر از دوماتریس  $B$  و  $A$  میباشند.

تعریف - دوماتریس  $B$  و  $A$  را مساوی گوئیم و مینویسیم  $A = B$ ، هرگاه

الف - تعداد سطرها و ستونهای آنها با هم برابر باشند (یعنی اینکه  $A$  و  $B$  دوماتریس  $m \times n$  باشند).

ب - عضوهای متناظر دوماتریس مساوی باشند.

مثلاً، تساوی زیر:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

فقط وقتی درست است که داشته باشیم:  $a=2$ ،  $b=3$ ،  $c=5$  و  $d=6$ .

در زیر دو مثال دیگر از ماتریسهای مساوی نوشته شده است:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{p}{2} & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{p} & 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{p} & p-1 \end{bmatrix} \text{ و } \begin{bmatrix} \sqrt{p} & \sqrt{p} \\ 3 & 2-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ \frac{9}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

مثال - در تساوی زیر  $x$  و  $y$  را به قسمی پیدا کنید که دو ماتریس مساوی شوند:

$$\begin{bmatrix} x+y & 3 \\ x-y & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

حل - این دو ماتریس هر دو  $2 \times 2$  بوده و ستونهای دوم آنها یکی است، پس باید

داشته باشیم:

$$\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=3 \end{cases} \Rightarrow x=4 \text{ و } y=1$$

هرگاه یکی از دو شرط تساوی دو ماتریس که در بالا گفته شد برقرار نباشد، آن گاه دو

ماتریس مساوی نخواهند بود. مثال :

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

### جمع ماتریسها

شرکتی برای کارمندان دولت در شهرهای شیراز، اصفهان و اهواز خانه‌های سازمانی ۴ اتاقی (نوع A) و ۵ اتاقی (نوع B) می‌سازد. این شرکت برای ساختن خانه‌های سازمانی در دو سال قراردادی به صورت زیر امضا کرده است :

شهر	سال اول		سال دوم	
	نوع A	نوع B	نوع A	نوع B
شیراز	۸۰ دستگاه	۳۰ دستگاه	۶۰ دستگاه	۳۰ دستگاه
اصفهان	۴۰ دستگاه	۵۰ دستگاه	۲۰ دستگاه	۷۰ دستگاه
اهواز	۳۰ دستگاه	۳۰ دستگاه	۴۰ دستگاه	۳۰ دستگاه

متن این قرارداد را برای هر سال می‌توان با یک ماتریس نشان داد :

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{نوع A} & \text{نوع B} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{نوع A} \\ \text{نوع B} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 80 & 30 \\ 40 & 50 \\ 30 & 30 \end{bmatrix} \end{matrix} ,$$

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{نوع A} & \text{نوع B} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{نوع A} \\ \text{نوع B} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 60 & 30 \\ 20 & 70 \\ 40 & 30 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

ممکن است شخصی سؤال کند که این شرکت در دو سال روی هم رفته از هر نوع خانه در هر شهرستان چند دستگاه خواهد ساخت. طبیعی است که برای پاسخ به این سؤال باید عضوهای متناظر دو ماتریس P و Q را باهم جمع کرد.

$$\begin{aligned}
 P+Q &= \begin{bmatrix} A & B \\ 80 & 30 \\ 40 & 50 \\ 30 & 30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A & B \\ 60 & 30 \\ 20 & 70 \\ 40 & 30 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 80+60 & 30+30 \\ 40+20 & 50+70 \\ 30+40 & 30+30 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 140 & 60 \\ 60 & 120 \\ 70 & 60 \end{bmatrix} \\
 &= R
 \end{aligned}$$

در اینجا ماتریس  $R$  به نام مجموع دو ماتریس  $P$  و  $Q$  خوانده می‌شود. هر کدام از ماتریسهای  $P$  و  $Q$  (عاملهای جمع) به صورت  $3 \times 2$  بوده در نتیجه  $R$  (مجموع دو ماتریس) نیز یک ماتریس  $3 \times 2$  است و هر عضو آن برابر مجموع عضوهای متناظر آن در  $P$  و  $Q$  می‌باشد. تعریف - فرض کنیم  $A$  و  $B$  دو ماتریس  $m \times n$  باشند. (یعنی این که تعداد سطرها با هم و تعداد ستونها با هم مساوی می‌باشند) مجموع  $A$  و  $B$  یک ماتریس  $m \times n$  است مانند  $C$  به طوری که هر عضو آن مساوی مجموع عضوهای متناظرش در  $A$  و  $B$  باشد.

مثال ۱ - دو ماتریس زیر داده شده‌اند؛ ماتریس  $A+B$  را بنویسید.

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

حل - چون هر یک از ماتریسهای  $A$  و  $B$  به صورت  $2 \times 3$  می‌باشد، پس عمل جمع تعریف شده است و طبق آنچه گفته شد داریم:

$$\begin{aligned}
 A+B &= \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}_{2 \times 3} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \\
 &= \begin{bmatrix} a+1 & b+2 & c+3 \\ d+4 & e+5 & f+6 \end{bmatrix}_{2 \times 3}
 \end{aligned}$$

جمع دو ماتریس که تعداد سطرهاى آنها یا تعداد ستونهاى آنها باهم برابر نباشد تعريف نشده است .

مثال ۲ - دو ماتریس زیر داده شده اند ؛ ماتریس  $A+B$  را بنویسید .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$$

حل - در اینجا  $A$  يك ماتریس  $2 \times 2$  و  $B$  يك ماتریس  $2 \times 3$  است . پس طبق آنچه گفته شد  $A+B$  تعريف نشده است .

اگر  $A$  يك ماتریس باشد، تعريف می كنیم :

$$2A = 2 \times A = A + A$$

### ضرب يك عدد در يك ماتریس

مثال ۱ - ماتریس  $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$  داده شده است ؛ ماتریس  $2 \times A$  را

بنویسید .

$$2 \times A = A + A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} : \text{طبق تعريف}$$

$$= \begin{bmatrix} 4+4 & 3+3 \\ 5+5 & 6+6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 4 & 2 \times 3 \\ 2 \times 5 & 2 \times 6 \end{bmatrix} : (\text{بنابه تعريف ضرب اعداد})$$

يعنى برای تعیین ماتریس  $2A$  ، عدد حقیقی ۲ را باید در تمام عضوهای  $A$  ضرب کرد.

تعريف - عدد حقیقی  $r$  و ماتریس  $A$  داده شده است؛ منظور از  $rA$  و یا  $r \times A$  ماتریسی

است که از ضرب عدد  $r$  در هر عضو  $A$  به دست می آید .

مثال ۱- هرگاه  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  ، داریم :

$$r.A = r \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ra & rb \\ rc & rd \end{bmatrix} \quad (r \text{ عدد حقیقی است})$$

باید توجه داشت که برخلاف عمل جمع دو ماتریس ، ضرب يك عدد در يك ماتریس همیشه

امكان پذیر است .



مثال ۲- اگر  $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ، خواهیم داشت :

$$\frac{4}{3}A = \frac{4}{3} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & \frac{8}{3} \\ \frac{4}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

### قرینه يك ماتريس

گفتیم که برای ضرب عدد حقیقی  $r$  در ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، عدد  $r$  را در هر یک

از عضوهای  $A$  ضرب می‌کنیم .

هرگاه  $r = -1$ ، خواهیم داشت :

$$\begin{aligned} -1 \times A &= -1 \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ماتریس  $-1 \times A$  را با  $-A$  نمایش داده آن را قرینه ماتریس  $A$  می‌خوانند .

$$-A = \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$$

قرینه ماتریس  $A$ ، ماتریسی است که هر عضو آن قرینه عضو متناظرش در  $A$  باشد .

مثال -

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \text{ برابر است با } \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \end{bmatrix} \text{ قرینه ماتریس}$$

### ماتریس صفر

از جمع دو ماتریس  $A$  و  $-A$  ماتریسی به دست می‌آید که همه عضوهای آن صفر است.

چنین ماتریسی به نام ماتریس صفر خوانده می‌شود .

$$\text{مثال - هرگاه } A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \text{، داریم :}$$

$$A + (-A) = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -a & -b & -c \\ -d & -e & -f \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a+(-a) & b+(-b) & c+(-c) \\ d+(-d) & e+(-e) & f+(-f) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

در حالت کلی ماتریس صفر را به صورت  $\bar{O}_{m \times n}$  و یا  $\bar{O}$  نمایش می‌دهند :

$$A + (-A) = \bar{O}$$

در زیر چند ماتریس صفر نوشته شده است :

$$\bar{O}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \bar{O}_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \bar{O}_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

با استفاده از قرینه يك ماتریس تفاضل دو ماتریس  $A$  و  $B$  را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$A - B = A + (-B)$$

مثال - دو ماتریس  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  و  $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$  داده شده است ؛

مطلوب است محاسبه  $3A - 2B$

$$\begin{aligned} 3A - 2B &= 3 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

### خواص جمع ماتریسهای $2 \times 2$

۱ - هرگاه  $A$  و  $B$  دو ماتریس  $2 \times 2$  باشند ، دیدید که مجموع این دو ماتریس نیز يك ماتریس  $2 \times 2$  است. به عبارت دیگر، از جمع دو ماتریس  $2 \times 2$  يك ماتریس  $2 \times 2$  به دست می‌آید و یا : مجموعه ماتریسهای  $2 \times 2$  نسبت به جمع ماتریسها بسته است .

۲ - جمع ماتریسهای  $2 \times 2$  خاصیت شرکت پذیری دارد . یعنی هرگاه  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  ،

$B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$  و  $C = \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix}$  سه ماتریس  $2 \times 2$  باشند، خواهیم داشت :

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

برای نشان دادن درستی این تساوی طرف راست آن را محاسبه می‌کنیم :

$$\begin{aligned} A + (B + C) &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \left( \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix} \right) \\ &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (e+m) & (f+n) \\ (g+p) & (h+q) \end{bmatrix} : \text{جمع ماتریسها} \\ &= \begin{bmatrix} a+(e+m) & b+(f+n) \\ c+(g+p) & d+(h+q) \end{bmatrix} : \text{جمع ماتریسها} \\ &= \begin{bmatrix} (a+e)+m & (b+f)+n \\ (c+g)+p & (d+h)+q \end{bmatrix} : \text{شرکت‌پذیری جمع} \\ &= \begin{bmatrix} (a+e) & (b+f) \\ (c+g) & (d+h) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix} : \text{در مجموعه اعداد} \\ &= \begin{bmatrix} (a+e) & (b+f) \\ (c+g) & (d+h) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix} : \text{جمع ماتریسها} \\ &= \left( \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix} : \text{جمع ماتریسها} \\ &= (A + B) + C \end{aligned}$$

۳ - ماتریس  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ، عضو بی‌اثر جمع در مجموعه ماتریسهای  $2 \times 2$  است .

یعنی این که هرگاه  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  يك ماتریس  $2 \times 2$  باشد، خواهیم داشت :

$$\begin{aligned} A + \bar{O} &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a+0 & b+0 \\ c+0 & d+0 \end{bmatrix} : \text{جمع ماتریسها} \\ &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : \text{عضو بی‌اثر جمع در مجموعه اعداد} \\ &= A \end{aligned}$$

همچنین داریم :

$$\bar{O} + A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0+a & 0+b \\ 0+c & 0+d \end{bmatrix}$$

چرا؟

$$= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

چرا؟

$$= A$$

پس:

$$A + \bar{0} = \bar{0} + A = A$$

۴- در مجموعه ماتریسهای  $2 \times 2$ ، هر ماتریس  $A$  تنها دارای يك عضو قرینه  $-A$  است، بطوریکه داریم:

$$A + (-A) = (-A) + A = \bar{0}$$

۵- جمع ماتریسهای  $2 \times 2$  دارای خاصیت جابجایی است. یعنی اگر  $A$  و  $B$  دو ماتریس  $2 \times 2$  باشند داریم:

$$A + B = B + A$$

۶- هرگاه  $r$  و  $s$  دو عدد حقیقی و  $A$  و  $B$  دو ماتریس  $2 \times 2$  باشند، داریم:

$$r(A + B) = rA + rB \quad (r + s)A = rA + sA$$

$$(rs)A = r(sA) \quad 1A = A$$

بعدها خواهید دید که خواص فوق به طور کلی برای مجموعه ماتریسهای  $m \times n$  نیز درست است.

## تمرین

۱- حاصل هر يك از جمعهای زیر را (در صورتی که تعریف شده باشد) به دست آورید.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

۲- حاصل هریک از عبارات زیر را به دست آورید :

$$2 \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} ; 8 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-2 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} ; \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

۳- در هریک از تساویهای زیر هرگاه  $X$  يك ماتریس  $2 \times 2$  باشد ، مطلوب است محاسبه  $X$ .

$$X + 2 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} ; X - \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

۴- ماتریسهای زیر داده شده‌اند :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} -3 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & 3 \end{bmatrix} \text{ و } C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

مطلوب است محاسبه :

$$2A + B - C ; 2A + 2B - 4C ; -2(A + 2C) - 3C ; -A + 2B$$

۵- ماتریسهای زیر داده شده‌اند :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ و } C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مطلوب است محاسبه :  $A + B + C ; 2A - B - 3C ; 3(A - B) + C$

۶- ماتریس  $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$  داده شده است ؛ ماتریس  $kA$  را در حالات زیر بنویسید :

$$k=3 ; k=-2 ; k=0 ; k=2+\sqrt{3}$$

۷- ماتریسهای زیر داده شده‌اند ؛

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 3 & 4 & 9 \end{bmatrix} \text{ و } C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

نشان دهید که :

$$A + B = B + A ; (A + B) + C = A + (B + C) ; -2(A + B) = -2A - 2B$$

۸- ماتریس زیر و عدد حقیقی  $k$  داده شده‌است ؛ ماتریس  $kI$  را بنویسید .

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

۹- حاصل هر یک از عبارتهای زیر را به دست آورید :

الف-

$$\cos\theta \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} + \sin\theta \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix}$$

ب-

$$\sqrt{2} \begin{bmatrix} 3\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 & \sqrt{2} \end{bmatrix} - \sin 45^\circ \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & \cos 45^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & \sin 45^\circ \end{bmatrix}$$

### ضرب يك ماتریس سطری در يك ماتریس ستونی

مثال ۱- دانش‌آموزی برای خرید لوازم مدرسه خود به يك لوازم‌التحریر فروشی رفت؛ او ۱۰ خودکار ، ۲۰ مداد و ۱۲ دفتر خرید ؛ در صورتی که بهای هر خودکار ۵ ریال و بهای هر مداد ۲ ریال و بهای هر دفتر ۶ ریال باشد ، تعیین کنید او چه مبلغ در مغازه لوازم‌التحریر فروشی خرید کرده است .

ارقام خریداری شده را می‌توان بایک ماتریس سطری به صورت زیر نمایش داد :

$$A = \begin{matrix} & \text{دفتر} & \text{مداد} & \text{خودکار} \\ \begin{bmatrix} 10 & 20 & 12 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

همچنین بهای هرواحد از این اجناس را ممکن است بایک ماتریس ستونی مشخص نمود:

$$B = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \text{بهای يك خودكار} \\ \text{بهای يك مداد} \\ \text{بهای يك دفتر} \end{array}$$

طبق آنچه در حساب خوانده‌اید، برای محاسبه این خرید باید اعمال ضرب و جمع را به صورت زیر انجام داد:

$$\text{ریال } 162 = (10 \times 5) + (20 \times 2) + (12 \times 6)$$

این محاسبه درست عمل ضرب ماتریس A در B را نشان می‌دهد که ممکن است به صورت

زیر نوشته شود:

$$\begin{aligned} & \left[ \begin{array}{ccc} 10 & 20 & 12 \end{array} \right] \times \left[ \begin{array}{c} 5 \\ 2 \\ 6 \end{array} \right] = \left[ \begin{array}{c} 10 \times 5 \\ 20 \times 2 \\ 12 \times 6 \end{array} \right] \\ & = \left[ \begin{array}{c} 50 + 40 + 72 \end{array} \right] \\ & = \left[ \begin{array}{c} 162 \end{array} \right] \\ & = 162 \text{ ریال} \end{aligned}$$


یعنی: برای به دست آوردن حاصل ضرب دوماتریس فوق به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

- اولین عضو ماتریس سطری را در اولین عضو ماتریس ستونی ضرب می‌کنیم.
- دومین عضو ماتریس سطری را در دومین عضو ماتریس ستونی ضرب می‌کنیم.
- سومین عضو ماتریس سطری را در سومین عضو ماتریس ستونی ضرب می‌کنیم.
- حاصل ضربهای به دست آمده را باهم جمع می‌کنیم.

۱- در این نوع مسائل همیشه ماتریس سطری اول نوشته می‌شود.

$$[10, 20, 12] \times \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} \text{ در شروع یادگیری این ضرب ، می توان حاصل ضرب}$$

را به صورت مستطیلهای زیرنوشت :



$$\begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} =$$

سه مستطیل سمت چپ را  
به اندازه  $90^\circ$  در جهت حرکت  
عقربه ساعت دوران داده به صورت  
رو به رو کنار یکدیگر قرار داد :  
آن گاه عضوهایی را که  
مقابل یکدیگر قرار گرفته اند  
درهم ضرب کرده مجموع آنها را  
به دست آورد :

$$[10, 20, 12] \times \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 20 & 12 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 12 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$= [10 \times 5 + 20 \times 2 + 12 \times 6]$$

$$= [50 + 40 + 72]$$

$$= [162] = 162$$

مثال ۲ - خانم خانه داری برای خرید روزانه به يك خواربار فروشی رفت . نیم کیلو



پنیر، ۲ کیلو شکر، ۳ کیلو برنج و ۰/۵ کیلو لوبیا خرید کرد. در صورتی که پنیر کیلویی ۱۵۰ ریال، شکر کیلویی ۲۵ ریال، برنج کیلویی ۴۲ ریال و لوبیا کیلویی ۳۰ ریال باشد، تعیین کنید این خانم چه مبلغ در این خواربار فروشی خرید کرده است.

همان‌طور که دیدید، ارقام خریده‌های این خانم را می‌توان بایک ماتریس سطری و بهای هر کیلو از اجناس خریداری شده را با یک ماتریس ستونی نشان داد.

$$\begin{bmatrix} ۰/۵ & ۲ & ۳ & ۰/۵ \end{bmatrix} \quad ؛ \quad \begin{bmatrix} ۱۵۰ \\ ۲۵ \\ ۴۲ \\ ۳۰ \end{bmatrix}$$

بهای یک کیلو پنیر  
بهای یک کیلو شکر  
بهای یک کیلو برنج  
بهای یک کیلو لوبیا

از ضرب این دو ماتریس مبلغی که خانم خرید کرده است به دست می‌آید:

$$\begin{bmatrix} ۰/۵ & ۲ & ۳ & ۰/۵ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ۱۵۰ \\ ۲۵ \\ ۴۲ \\ ۳۰ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۰/۵ \\ ۲ \\ ۳ \\ ۰/۵ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ۱۵۰ \\ ۲۵ \\ ۴۲ \\ ۳۰ \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} ۰/۵ \times ۱۵۰ + ۲ \times ۲۵ + ۳ \times ۴۲ + ۰/۵ \times ۳۰ \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} ۲۶۶ \end{bmatrix} = ۲۶۶ \text{ ریال}$$

توجه کنید که ضرب یک ماتریس سطری A در یک ماتریس ستونی B فقط وقتی تعریف شده است که تعداد ستونهای ماتریس A مساوی با تعداد سطرهاى ماتریس B باشد.

**قانون (۱) -** اگر A یک ماتریس  $۱ \times n$  و B یک ماتریس  $n \times ۱$  باشد، برای به دست آوردن حاصل ضرب AB به صورت زیر عمل می‌کنیم:

- اولین عضو ماتریس سطری را در اولین عضو ماتریس ستونی ضرب می‌کنیم.
- دومین عضو ماتریس سطری را در دومین عضو ماتریس ستونی ضرب می‌کنیم.
- .....
- آخرین عضو ماتریس سطری را در آخرین عضو ماتریس ستونی ضرب می‌کنیم.
- حاصل ضربهای به دست آمده را باهم جمع می‌کنیم:

در زیرچند مثال از ضرب ماتریسهای سطری در ستونی نوشته شده است :

$$\begin{aligned} \text{الف-} \quad \begin{bmatrix} 2 & -3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 \times 4 + (-3) \times 9 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 - 27 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -19 \end{bmatrix} = -19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ب-} \quad \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 7 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 \times -2 + 3 \times 2 + 5 \times 7 + 4 \times 6 + 2 \times 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 + 6 + 35 + 24 + 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 64 \end{bmatrix} = 64 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{ج- چون تعداد ستونهای ماتریس سمت چپ} \\ \text{برابر تعداد سطرهاى ماتریس سمت راست نیست} \\ \text{لذا عمل ضرب تعریف نشده است .} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{د- عمل ضرب رو برو نیز تعریف نشده} \\ \text{است .} \end{array}$$

### ضرب يك ماتریس در يك ماتریس ستونی

**مثال ۱ -** سوسن و یاسمین برای خرید به يك فروشگاه رفتند . سوسن ۳ كتاب داستان و يك خودنويس و یاسمین ۴ كتاب داستان و ۲ خودنويس خرید کرد . در صورتی كه بهای هر كتاب داستان ۵۰ ریال و بهای هر خودنويس ۳۰۰ ریال باشد، تعیین كنید هريك از آنها چه مبلغ خرید کرده است .

تعداد کتاب و خودنویسهای خریداری شده به وسیله سوسن و یاسمین را می توان به صورت ماتریس زیر نشان داد :

$$A = \begin{bmatrix} \text{کتاب} & \text{خودنویس} \\ 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{سوسن} \\ \text{یاسمین} \end{matrix}$$

همچنین بهای يك كتاب و يك خودنویس را به صورت ماتریس زیر نمایش می دهیم :

$$B = \begin{bmatrix} \text{بهای يك كتاب} & \text{بهای يك خودنویس} \\ 50 & 300 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{ریال} \end{matrix}$$

برای تعیین مبلغ خرید هریک ، طبق آنچه در حساب خوانده اید ، باید تعداد کتابها و خودنویسهای خریداری شده به وسیله هر نفر را در قیمت مربوط به آنها ضرب کرد :

بهای هر خودنویس تعداد خودنویس بهای هر کتاب تعداد هر کتاب

$$\text{ریال } 450 = 3 \times 50 + 1 \times 300 \quad \text{خرید سوسن :}$$

$$\text{ریال } 800 = 4 \times 50 + 2 \times 300 \quad \text{خرید یاسمین :}$$

این محاسبات درست عمل ضرب  $A \times B$  را نشان می دهد (عمل ضرب تعریف شده است. چرا؟)

$$A \times B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 300 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 50 + 1 \times 300 \\ 4 \times 50 + 2 \times 300 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 450 \\ 800 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{خرید سوسن :} \\ \text{خرید یاسمین :} \end{matrix}$$

چگونگی عمل ضرب در زیر تشریح شده است :

ماتریس مربع سمت چپ را به صورت دو ماتریس سطری ، یکی مربوط به خرید سوسن و دیگری مربوط به خرید یاسمین تجزیه نموده هر کدام از آنها را به طور جداگانه طبق قانون (۱)

در ماتریس ستونی سمت راست ضرب می کنیم :

الف - خرید سوسن :

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 300 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 50 + 1 \times 300 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 450 \end{bmatrix}$$

ب - خرید یاسمین :

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 300 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \times 50 + 2 \times 300 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 800 \end{bmatrix}$$

یا به طور خلاصه :

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 50 \\ 300 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \times 50 + 2 \times 300 \\ 4 \times 50 + 2 \times 300 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 450 \\ 800 \end{bmatrix}$$

قانون (۲) - اگر  $A$  يك ماتریس  $m \times n$  و  $B$  يك ماتریس  $n \times 1$  باشد ، حاصل ضرب  $A$  در  $B$  به صورت زیر به دست می آید .

- سطر اول آن ماتریس را در ماتریس متونی ضرب کرده ، عدد حاصل را عضو اول حاصل ضرب قرار می دهیم .

- سطر دوم آن ماتریس را در ماتریس متونی ضرب کرده ، عدد حاصل را عضو دوم حاصل ضرب قرار می دهیم .

- سطر  $m$  آن ماتریس را در ماتریس متونی ضرب کرده ، عدد حاصل را عضو  $m$  ام حاصل ضرب قرار می دهیم .

مثال ۲- دو ماتریس زیر داده شده اند ، ماتریس  $A \times B$  را بنویسید .


$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & -2 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \text{ و } B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

الف- چون تعداد ستونهای A برابر تعداد سطرهای B است، لذا  $A \times B$  تعریف شده است.

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 5 & -2 \\ 7 & 9 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$3 \times 2 \qquad 2 \times 1$

برای تعیین حاصل ضرب طبق قانون (۲) عمل می کنیم :



آیا در مثال ۲،  $B \times A$  تعریف شده است ؟

ضرب يك ماتريس  $m \times p$  در يك ماتريس  $p \times n$  .

مثال ۱- دو ماتريس  $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$  و  $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  داده شده اند ،

ماتريس  $A \times B$  را بنويسيد .

هر کدام از ماتريسهای A و B ،  $2 \times 2$  بوده در نتیجه  $A \times B$  معنا دارد :

$$A \times B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

برای تعیین این حاصل ضرب، ماتریس سمت راست را به صورت دو ماتریس ستونی تجزیه کرده  $A \times B$  را به شکل زیر می نویسیم .

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{الف- ستون اول } A \times B$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{ب- ستون دوم } A \times B$$

اکنون حاصل ضربهای فوق را طبق قانون (۲) به دست می آوریم :

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \times 2 + 5 \times 3 \\ 3 \times 2 + (-2) \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{الف- ستون اول } A \times B$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \times 1 + 5 \times 4 \\ 3 \times 1 + (-2) \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ -5 \end{bmatrix} \quad \text{ب- ستون دوم } A \times B$$

و یا به طور خلاصه :

$$A \times B = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 \\ -5 \end{bmatrix}$$

ستون دوم      ستون اول

**قانون (۳) -** اگر  $A$  یک ماتریس  $m \times p$  و  $B$  یک ماتریس  $p \times n$  باشد ، برای به دست

آوردن ماتریس  $AB$  به صورت زیر عمل می کنیم .

- ماتریس  $B$  را به  $n$  ماتریس ستونی تجزیه می کنیم .

- ماتریس  $A$  را طبق قانون (۲) در هر یک از این ماتریسهای ستونی ضرب می کنیم .

- حاصل ضربهای به دست آمده را که به صورت ماتریسهای ستونی هستند ، از چپ به راست

ستونهای اول تا  $n$  ام ماتریس حاصل ضرب قرار می دهیم .

**مثال ۲ -** دو ماتریس  $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$  و  $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$  داده شده اند ماتریس

$B \times A$  را بنویسید . چون دو ماتریس داده شده  $2 \times 2$  می باشند  $B \times A$  تعریف شده است .

$$B \times A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$$

مانند مثال ۱ عمل می کنیم :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 4 + 1 \times 3 \\ 3 \times 4 + 4 \times 3 \end{bmatrix}$$

ستون اول حاصل ضرب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 5 + 1 \times -2 \\ 3 \times 5 + 4 \times -2 \end{bmatrix}$$

ستون دوم حاصل ضرب:

و یا به طور خلاصه :

$$B \times A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 4 + 1 \times 3 & 2 \times 5 + 1 \times -2 \\ 3 \times 4 + 4 \times 3 & 3 \times 5 + 4 \times -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 11 & 8 \\ 24 & 7 \end{bmatrix}$$

در مثالهای (۱) و (۲) حاصل ضربهای  $A \times B$  و  $B \times A$  هر دو تعریف شده اند اما

مساوی نیستند :

$$A \times B \neq B \times A$$

و این در حالت کلی نیز درست است یعنی : ضرب ماتریسها خاصیت جابجائی ندارد .

مثال ۳- دو ماتریس  $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$  و  $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$  داده شده اند ، حاصل

ضرب  $A \times B$  را بنویسید .

در اینجا تعداد ستونهای ماتریس  $A$  برابر با تعداد سطرهای ماتریس  $B$  است و داریم :

$$A \times B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix}$$

$2 \times 2 \qquad 2 \times 3 \qquad 2 \times 3$

این حاصل ضرب طبق قانون (۳) به دست می آید .

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 2 \\ 0 \times 1 + 5 \times 2 \end{bmatrix}$$

ستون اول حاصل ضرب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 3 + 3 \times 4 \\ 0 \times 3 + 5 \times 4 \end{bmatrix}$$

ستون دوم حاصل ضرب:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 5 + 3 \times 6 \\ 0 \times 5 + 5 \times 6 \end{bmatrix} : \text{ستون سوم حاصل ضرب:}$$

و یا به طور خلاصه :

ستون سوم ستون دوم ستون اول

$$A \times B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 18 & 28 \\ 10 & 20 & 30 \end{bmatrix}$$

آیا در این مثال حاصل ضرب  $B \times A$  تعریف شده است ؟

ماتریس واحد

دو ماتریس  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  و  $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  داده شده‌اند ، مطلوب است محاسبه

$A \times I$  و  $I \times A$  .

حاصل ضرب  $I \times A$  را به دست می‌آوریم :

$$\begin{aligned} I \times A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 \times a + 0 \times c & 1 \times b + 0 \times d \\ 0 \times a + 1 \times c & 0 \times b + 1 \times d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \\ &= A \end{aligned}$$

به همین ترتیب  $A \times I$  را محاسبه می‌کنیم :

$$\begin{aligned} A \times I &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a \times 1 + b \times 0 & a \times 0 + b \times 1 \\ c \times 1 + d \times 0 & c \times 0 + d \times 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a + 0 & 0 + b \\ c + 0 & 0 + d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \\ &= A \end{aligned}$$



در اینجا می بینید که :

$$A \times I = I \times A = A$$

ماتریس  $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  ماتریس واحد ضرب در مجموعه ماتریسهای  $2 \times 2$  نامیده می شود .

در این ماتریس عضوهای يك از چپ به راست روی خطی قرار گرفته اند كه به نام قطر

اصلی ماتریس خوانده می شود . پس :

هر ماتریس مربع  $n \times n$  كه عضوهای قطراصلیش يك وسایر عضوهای آن صفر باشند به نام ماتریس

واحد خوانده شده آن را با  $I_{n \times n}$  یا به طور ساده  $I$  نمایش می دهند .

در زیر چند ماتریس واحد نوشته شده است :

$$I_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_{4 \times 4} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

قطر اصلی                      قطر اصلی

### دترمینان ماتریسهای $2 \times 2$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

در ماتریس :

عدد  $ad - bc$  ( تفاضل حاصل ضرب اعدادی كه روی دو قطر ماتریس قرار دارند ) به نام

دترمینان ماتریس  $A$  خوانده شده آن را با  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$  یا  $|A|$  یا  $\Delta$  نمایش می دهند :

$$\Delta = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

مثال - در زیر دترمینان چند ماتریس  $2 \times 2$  نوشته شده است :

$$\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 5 \times 3 - 6 \times 7$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3 \times 1 - 2 \times 0$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 4 \times 3 - 6 \times 2$$

باید توجه داشت که ماتریس يك جدول آرایش اعداد است<sup>۱</sup>. در صورتی که دترمینان يك عدد می باشد.

## تمرین

( تمرینات ۱ تا ۴ را با استفاده از ضرب ماتریسها حل کنید ) .

۱- يك کارخانه از سه نوع سوخت ، نفت ، بنزین و گازوئیل استفاده می کند . این کارخانه در هفته ۴۲۰ لیتر نفت ، ۱۰۰۰ لیتر بنزین و ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل مصرف دارد . در صورتی که نفت لیتری ۲/۵ ریال ، بنزین لیتری ۶ ریال و گازوئیل لیتری ۳ ریال باشد ، تعیین کنید هزینه سوخت هفتگی این کارخانه را .

۲- خانم خانه داری از خواربار فروشی محل ۵/۵ کیلو کره ، يك کیلو پنیر ، ۵ کیلو شکر و ۱۵ کیلو برنج به قیمت های زیر خرید کرد :

کره کیلویی ۲۴۰ ریال ، پنیر کیلویی ۱۵۰ ریال ، شکر کیلویی ۲۸ ریال و برنج کیلویی ۶۵ ریال .

اگر این خانم ۵۰ ریال هزینه رفت و برگشت به يك فروشگاه تعاونی می پرداخت ، قادر بود این اجناس را در يك فروشگاه تعاونی به قیمت های زیر بخرد :

کره کیلویی ۲۲۰ ریال ، پنیر کیلویی ۱۳۰ ریال ، شکر کیلویی ۲۴ ریال و برنج کیلویی ۵۸ ریال .

تعیین کنید اگر این خانم خرید دوم را ترجیح می داد ، چقدر به صرف او تمام می شد .  
۳- يك کارخانه سه نوع رادیوی قابل حمل تولید می کند: رادیو ترانزیستوری يك موج (مدل A) ، رادیو ترانزیستوری دو موج (مدل B) و رادیو ترانزیستوری سه موج (مدل C) . رادیوی مدل A شامل يك ترانزیستور ، ۱۰ مقاومت و ۵ خازن ؛ رادیوی مدل B شامل ۲ ترانزیستور ، ۱۸ مقاومت و ۷ خازن و رادیوی مدل C شامل ۳ ترانزیستور ، ۲۴ مقاومت و ۱۰ خازن است .

هرگاه فروش هفتگی این کارخانه از سه نوع رادیوی A ، B و C به ترتیب ۱۰۰ ، ۲۵۰ و ۸۰ دستگاه باشد معین کنید مصرف ترانزیستور ، مقاومت و خازن این کارخانه را در يك هفته .

۱- فقط ماتریس  $1 \times 1$  را طبق قرارداد مساوی عدد می گیریم .

۴- ضربهای زیر را انجام دهید :

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

۵- تعداد سطرها و ستونهای هر يك از حاصل ضربهای زیر را به دست آورید :

الف - ماتریس  $3 \times 2$  در  $2 \times 4$  ؛ ب - ماتریس  $8 \times 2$  در  $2 \times 9$  ؛ ج - ماتریس

$2 \times 3$  در  $3 \times 3$  .

۶- ضربهای زیر را انجام دهید :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

۷- در تساویهای زیر مقدار  $x$  را به دست آورید :

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 18 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ a & b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{b} \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

۸- در هر يك از تساویهای زیر مقادیر  $a$  و  $b$  را به دست آورید :

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 2 & b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

۹- دو ماتریس  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$  و  $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$  داده شده اند؛ نشان دهید

که  $A \times B \neq B \times A$  .

۱۰- ماتریسهای  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ،  $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$  و  $C = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$  داده

شده‌اند؛ نشان دهید که:

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$$

۱۱- ماتریس  $M = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$  داده شده است؛ هرگاه قرار دهیم  $M \times M = M^2$


ماتریس  $M^2$  را بدست آورید.

### ماتریس نقاط

گفتیم که ماتریس کاربرد فراوان دارد. حال می‌خواهیم بعضی از این کاربردها را در هندسه مورد مطالعه قرار دهیم:


در صفحه مختصات، نقطه  $A$  نظیر زوج مرتب  $(a, b)$  ازعددهای حقیقی را می‌توان

بایک ماتریس  $1 \times 2$  به صورت زیر نشان داد:



$$A = \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}$$


در زیر، با این قرارداد، زوجهای نظیر نقاط  $B$  و  $C$  با ماتریس نشان داده شده‌اند:



$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

می‌دانیم که یک چند ضلعی با رأسهای مشخص می‌شود و مختصات هر رأس را نیز با

ماتریس  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  نمایش می‌دهند. بنابراین برای نمایش يك چند ضلعی می‌توان از ماتریس استفاده کرد. در چهار ضلعی زیر، مختصات رأسها با استفاده از ماتریس نوشته شده است.



حال این مختصات را به ترتیب از A به D ستونهای اول تا چهارم يك ماتریس  $2 \times 4$  قرار می‌دهیم:

$$\begin{matrix} & A & B & C & D \\ \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$


این ماتریس که برای نمایش چهارضلعی ABCD به کار رفته است به نام ماتریس نقاط

خوانده می‌شود. با این قرارداد ماتریس قطر AC در شکل فوق برابر است با  $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

مثال - مثلث ABC با ماتریس زیر مشخص شده است، شکل آن را رسم کنید:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

ستونهای این ماتریس از چپ به راست به ترتیب مختصات رئوس A، B و C می‌باشند:



$$A \quad B \quad C$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

حال نمودار هر نقطه را در صفحه به دست آورده

نقاط حاصل را به هم وصل می کنیم :

### تبدیلات و ماتریسها

دیدید که نقطه  $P(a, b)$  را به صورت ماتریس ستونی  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  نمایش دادیم ، از ضرب

یک ماتریس  $2 \times 2$  در  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  به صورت زیر :

$$\begin{bmatrix} c & d \\ e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

یک ماتریس ستونی جدید مثل  $\begin{bmatrix} a' \\ b' \end{bmatrix}$  به دست می آید که نظیر نقطه  $P'(a', b')$

می باشد . نقطه  $P'$  را تبدیل یا تصویر نقطه  $P$  تحت آن ماتریس می خوانند . ماتریس


$\begin{bmatrix} c & d \\ e & f \end{bmatrix}$  که به نام ماتریس تبدیل خوانده می شود همواره در سمت چپ نوشته می شود .

مثلا هرگاه ماتریس  $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$  را به ترتیب در ماتریس نقاط  $A(1, 0)$  و

$B(0, 1)$  ضرب کنیم ماتریس نقاط  $A$  و  $B'$  به دست می آید :

$$\begin{matrix} A & A' \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{matrix} & B & B' \\ \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

با تبدیل ترتیب تبدیلها  
یا تصاویر نقاط A و B تحت ماتریس

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

بوده و پاره خط A'B'

تصویر AB می باشد.

مثال - مربع ABCD با ماتریس

زیر مشخص شده است :

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

تبدیل این مربع را به ماتریس

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$


به دست آورید .

طبق آنچه گفته شد ، کافی است ماتریس A را در ماتریس  $2 \times 4$  فوق به صورت زیر

ضرب کنیم :

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{matrix} A' & B' & C' & D' \\ \begin{bmatrix} -4 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & -4 \end{bmatrix} \end{matrix}$$




چهار ضلعی  $A'B'C'D'$  تبدیل مربع  $ABCD$  تحت ماتریس  $A$  است. بنابراین می‌توان گفت: هر ماتریس  $2 \times 2$  نظیر یک تبدیل در صفحه است.


### ماتریس تقارن در محور $x$ ها

نقطه  $P(4, 1)$  را در نظر می‌گیریم، هرگاه ماتریس  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$  را در ماتریس نقطه  $P$

به صورت زیر ضرب کنیم:



نقطه جدید  $(4, -1)$  با نقطه مفروض دارای یک طول بوده ولی عرضهای آنها قرینه یکدیگر می‌باشند. چنین دوتنقطه‌ای را قرینه یکدیگر نسبت به محور  $x$  ها می‌نامند. در زیر قرینه‌های نقاط  $(-1, 2)$  و  $(2, 3)$  به همین طریق به دست آمده است:






به طور کلی هرگاه ماتریس  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$  را در ماتریس نقطه  $P(x, y)$  به صورت زیر

ضرب کنیم، قرینه آن نقطه نسبت به محور  $x$  ها به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix}$$



ماتریس  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$  به نام ماتریس تقارن در محور  $x$  ها خوانده می شود.


مثال - مثلث  $ABC$  با ماتریس زیر مشخص شده است:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \quad (\text{ستونها از چپ به راست به ترتیب متناظر با مختصات } C, B, A)$$

می باشند) قرینه این مثلث را نسبت به محور  $x$  ها به دست آورید.

طبق آنچه گفته شد، کافی است ماتریس  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$  را در ماتریس فوق به صورت

زیر ضرب کرد:




$$\begin{matrix} & A & B & C \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} = \\ & A' & B' & C' \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

ماتریس حاصل، ماتریس قرینه مثلث

$ABC$  نسبت به محور  $x$  هاست.

ماتریس تقارن در محور  $y$  ها

نقطه  $(x, y)$  را در صفحه مختصات



در نظر گرفته، از این نقطه عمودی بر محور  $y$  ها  
 فرود آورده، این عمود را به اندازه قدر مطلق طول  
 نقطه (شکل مقابل) امتداد می دهیم، نقطه به  
 دست آمده  $(-x, y)$  با نقطه مفروض هم عرض  
 بوده ولی طولهای آنها قرینه یکدیگر می باشند.  
 دو نقطه  $(x, y)$  و  $(-x, y)$  را قرینه  
 یکدیگر نسبت به محور  $y$  ها می خوانند. برای  
 پیدا کردن ماتریس تقارن در محور  $y$  ها باید  
 ماتریس مربعی را پیدا کرد که اگر آن را در  
 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$  ضرب کنیم، نقطه  $\begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix}$  به دست آید<sup>۱</sup>

فرض کنید  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  ماتریس مطلوب باشد باید داشته باشیم :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x \\ y \end{bmatrix}$$

این تساوی برای تمام نقاط صفحه در نتیجه برای  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  و  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  نیز درست است :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

از ضرب ماتریسهای طرف چپ هر یک از این تساویها حاصل می شود :

$$\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ و } \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

که طبق تعریف تساوی دو ماتریس به دست می آید :

$$a = -1 ; b = 0 ; c = 0 ; d = 1$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

در نتیجه ماتریس تقارن در محور  $y$  ها برابر می شود با :

۱- گاهی اوقات به ماتریس نقطه خود نقطه اطلاق شده است .


تمرین - با استفاده از همین روش ماتریس تقارن در محور  $x$  ها را به دست آورید .  
مثال - چهار ضلعی ABCD با ماتریس زیر مشخص شده است :

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

ماتریس قرینه این چهار ضلعی را نسبت به محور  $y$  ها به دست آورید .

کافی است ماتریس  $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  را در ماتریس چهار ضلعی فوق به صورت زیر ضرب کنیم.

$$\begin{matrix} & A & B & C & D & & A' & B' & C' & D' \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -4 & -3 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$



### ماتریس تقارن در مبدأ مختصات و خطوط $y=x$ و $y=-x$

باروش متشابه آنچه در تعیین ماتریس تقارن نسبت به محور  $y$  ها گفته شد به آسانی می توان ماتریس تقارن در مبدأ مختصات یا خطوط  $y=x$  و  $y=-x$  را به دست آورد . در زیر ماتریسهای تقارن نسبت به مبدأ مختصات و این دو خط نوشته شده است :

ماتریس تقارن در مبدأ مختصات :  $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

ماتریس تقارن در خط  $y=x$  :  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

ماتریس تقارن در خط  $y=-x$  :  $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$


به عنوان تمرین درستی مطالب بالا را تحقیق کنید .

## ماتریس دوران

قبل از پیدا کردن ماتریسی که نمایش دورانی حول نقطه  $O$  و به اندازه  $\alpha^\circ$  در خلاف جهت حرکت عقربه ساعت باشد، توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

هرگاه تبدیلهای نقاط  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  و  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  را تحت ماتریس مربع  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  به دست آوریم

خواهیم داشت:




$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix} \quad (2)$$

یعنی تبدیلهای نقاط  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  و  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  تحت ماتریس مربع  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  به ترتیب عبارتند از ستونهای اول و دوم این ماتریس. از این خاصیت برای به دست آوردن ماتریس دوران استفاده می‌شود.

در شکل زیر، نقاط  $P(1, 0)$  و  $Q(0, 1)$  و تبدیلهای آنها پس از دوران  $\alpha^\circ$



حول مبدأ مختصات یعنی  $P'$  و  $Q'$  نشان داده شده است. در اینجا دیده می‌شود که نقطه

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  پس از دوران  $\alpha^\circ$  حول نقطه  $O$  به نقطه

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{bmatrix} \text{ تبدیل می‌شود.}$$

(طبق تعریف سینوس و کسینوس در مثلث قائم الزاویه  $OHP'$  که وتر آن واحد است.)

که طبق تساوی (۱)، ستون چپ ماتریس دوران را تشکیل می‌دهد. همچنین نقطه  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

پس از دوران  $\alpha^\circ$  حول مبدأ مختصات به نقطه  $\begin{bmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{bmatrix}$  تبدیل می‌شود (طبق تعریف سینوس و کسینوس در مثلث قائم الزاویه  $OQ'H$  با وتر واحد و در نظر گرفتن جهت) که طبق تساوی (۲) ستون راست ماتریس دوران را تشکیل می‌دهد. بنابراین ماتریس دوران حول نقطه  $O$  و به اندازه  $\alpha^\circ$  برابر است با :

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

اگر به جای  $\alpha$  زاویه  $30^\circ$  قرار دهیم، ماتریس دوران حول مبدأ مختصات و به اندازه  $30^\circ$  به دست می‌آید :

$$\text{ماتریس دوران } 30^\circ \text{ حول مبدأ در جهت مثبت} = \begin{bmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$$

## تمرین

۱- در زیر چند ماتریس تقارن در مبدأ مختصات، محورهای  $y=x$  و  $y=-x$

نوشته شده است. هر کدام از آنها را با اسم مشخص کنید. (مثلاً  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ، ماتریس تقارن در خط  $y=x$  است).

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

۲- هر کدام از تساویهای زیر را تفسیر کرده، توضیح دهید که در هر تساوی قرینه يك نقطه نسبت به چه خط یا محوری به دست آمده است :

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -6 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

۳- با استفاده از ماتریسها قرینه هر کدام از نقاط زیر را نسبت به خط یا محور داده شده به دست آورید .

نقطه  $(-۱, ۶)$  نسبت به خط  $x = -y$ ؛ نقطه  $(۳, -۲)$  نسبت به محور  $y$ ؛  
نقطه  $(۲, -۶)$  نسبت به خط  $y = x$ ؛ نقطه  $(۵, -۲)$  نسبت به مبدأ مختصات؛ نقطه  
 $(a, b)$  نسبت به محور  $x$ ها .

۴- در زیر يك نقطه و تصویر آن داده شده است . ماتریس مربوط به هرتبديل را  
پیدا کرده با عمل ضرب درستی آنها را تحقیق کنید . تصویر نقطه  $(-۲, ۶)$  عبارت است از  
 $(۶, -۲)$ ؛ تصویر نقطه  $(۶, -۲)$  عبارت است از  $(۲, -۶)$  تصویر نقطه  $(۱, ۰)$   
عبارت است از  $(۰, -۱)$ ، تصویر نقطه  $(a, b)$  عبارت است از  $(b, -a)$ ، تصویر  
نقطه  $(۵, -۵)$  عبارت است از  $(-۵, -۵)$  .

۵- مطلوب است تعیین : الف - قرینه مثلث  $\begin{bmatrix} ۰ & ۲ & -۳ \\ ۰ & ۳ & ۸ \end{bmatrix}$  نسبت به محور  $x$ ها؛

ب - قرینه چهار ضلعی  $\begin{bmatrix} ۵ & ۴ & ۳ & -۴ \\ ۰ & ۱ & ۳ & ۲ \end{bmatrix}$  نسبت به محور  $y$ ؛ ج - قرینه مثلث

$\begin{bmatrix} -۸ & ۰ & -۸ \\ ۶ & ۰ & -۶ \end{bmatrix}$  نسبت به خط  $y = x$  .

۶- ماتریسهای دوران حول مبدأ مختصات را برای هريك از زوایای صفر درجه،  $۹۰^\circ$  و  $۱۸۰^\circ$  بنویسید .

۷- تصویر نقطه  $(-۳, \frac{1}{۲})$  را تحت هريك از دورانهای  $۴۵^\circ$ ،  $۶۰^\circ$  و  $۹۰^\circ$  در  
حول مبدأ مختصات به دست آورید .

۸- اگر  $A$  ماتریس دوران  $۳۰^\circ$  و  $B$  ماتریس دوران  $۴۵^\circ$  حول مبدأ مختصات باشند  
ماتریس  $A \times B$  نمایش چه دورانی خواهد بود .

۹- تصویر نقطه  $(۲, -۱)$  را تحت هريك از دورانهای  $۷۵^\circ$ ،  $۱۲۰^\circ$ ،  $۲۴۰^\circ$ ،  
 $۳۱۵^\circ$  حول مبدأ به دست آورید .

۱۰- تصویر نقطه  $(۵, -۲)$  را تحت هريك از دورانهای  $۱۵۰^\circ$  و  $۲۱۰^\circ$  حول مبدأ  
مختصات به دست آورید .

۱۱- تصویر هريك از چند ضلعیهای زیر را که با ماتریس نشان داده شده‌اند، تحت  
دورانهای خواسته شده به دست آورید :

مثلث  $\begin{bmatrix} ۱ & ۴ & ۴ \\ ۲ & ۲ & -۱ \end{bmatrix}$  تحت زاویه  $۲۷^\circ$ ؛ چهار ضلعی  $\begin{bmatrix} -۱ & -۲ & ۸ & ۳ \\ ۲ & ۲ & -۶ & -۶ \end{bmatrix}$

تحت زاویه  $90^\circ$ ؛ چهار ضلعی  $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$  تحت زاویه  $30^\circ$ ، مثلث

تحت زاویه  $180^\circ$   $\begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 10 & -6 & 7 \end{bmatrix}$ .

۱۲- نقطه دلخواه  $(x, y)$  از صفحه را حول مبدأ مختصات و به اندازه  $\alpha^\circ$  دوران داده تصویر آن را  $(x', y')$  می‌نامیم؛ با استفاده از ماتریس،  $x'$  و  $y'$  را بر حسب  $x$  و  $y$  و نسبت‌های مثلثاتی زاویه دوران، محاسبه کنید.

۱۳- هرگاه به نقطه  $P$  دو دوران متوالی وهم جهت حول نقطه  $O$ ، یکی به اندازه  $\alpha^\circ$  و دیگری به اندازه  $\beta^\circ$  دهیم، نقطه  $P$  در همان جهت و به اندازه  $\alpha^\circ + \beta^\circ$  حول  $O$  دوران خواهد کرد، با استفاده از این مطلب به نقطه  $(1, 0)$  دو دوران متوالی  $\alpha^\circ$  و  $\beta^\circ$  حول مبدأ مختصات می‌دهیم با کمک ماتریسها نشان دهید که:

$$\cos(\alpha^\circ + \beta^\circ) = \cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ - \sin \alpha^\circ \sin \beta^\circ$$

$$\sin(\alpha^\circ + \beta^\circ) = \sin \alpha^\circ \cos \beta^\circ + \cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ$$

۱۴- ماتریس مربع  $OPQR$  برابر است با:


$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

هریک از ماتریسهای زیر را به‌طور جداگانه در ماتریس فوق ضرب کرده روی یک دستگاه مختصات شکل حاصل را در هر حالت با شکل اصلی مقایسه کنید.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

## بودار

يك قایق پارویی ابتدا در نقطه  $A$  بوده پس از يك دقیقه به وسیله جریان آب رودخانه به نقطه  $A'$  برده می شود (شکل زیر). قایق پارویی دیگری در لحظه حرکت قایق اول در نقطه  $B$  بوده پس از يك دقیقه به وسیله جریان آب به نقطه  $B'$  می رسد (جریان آب یکنواخت، مسیر مستقیم، پاروها متوقف و قایقها متشابه فرض شده اند).




حرکت هر يك از قایقها يك پاره خط جهت دار را نشان می دهد. این پاره خط مستقیم بوده نقطه شروع حرکت قایق مثلاً  $A$  را به نقطه نهایی آن  $A'$  وصل می کند. بنابراین جهت هر پاره خط نشان می دهد که قایق در کدام جهت تغییر مکان داده است. در مثال بالا شباهت بین دو پاره خط به طور روشنی نمایان است. این شباهت مربوط به این حقیقت است که وقتی قایق اول از نقطه  $A$  به طرف  $A'$  حرکت می کند، قایق دوم نیز در همان لحظه و در همان جهت شروع به حرکت کرده در لحظه ای که قایق اول به  $A'$  می رسد قایق دوم نیز در نقطه  $B'$  خواهد بود. هر يك از پاره خطهای جهت دار  $AA'$  و  $BB'$ ، که از این به بعد آنها را به

۱- در حقیقت يك نقطه از قایق در  $A$  است.



صورت:  $\vec{AA'}$  و  $\vec{BB'}$  نشان می‌دهیم، برای مشخص نمودن حرکت مزبور کافی می‌باشد. در مثال فوق، تحت شرایط ذکر شده اگر قایق از نقطه A یا B یا هر نقطه دیگر رودخانه حرکت کند، واضح است که پاره‌خطهای جهت‌داری که نمایش حرکت این قایق در طول مدت يك دقیقه می‌باشند موازی، هم‌جهت و دارای طولهای مساوی بوده یعنی هم‌ارز خواهند بود. طبق آنچه گفته شد می‌توان گفت که: يك پاره خط جهت‌دار است هرگاه يك سر آن به عنوان ابتدا و سر دیگرش به عنوان انتها در نظر گرفته شود. همچنین، دو پاره‌خط  $AA'$  و  $BB'$  را در صفحه هم‌جهت‌گویند هرگاه خطوط  $AA'$  و  $BB'$  موازی بوده و هر دو در يك طرف خط  $AB$  واقع باشند. پاره‌خطهای موازی، هم‌جهت و هم‌طول را هم‌ارز می‌خوانیم. در حالت کلی: دو پاره‌خط  $\vec{AA'}$  و  $\vec{BB'}$  هم‌ارز هستند اگر و فقط اگر چهارضلعی  $ABB'A'$  متوازی‌الاضلاع باشد.




حال رابطه «هم‌طول و هم‌جهت بودن» را در مجموعه پاره‌خطهای جهت‌دار صفحه در نظر بگیرید، به سادگی می‌توان نشان داد که این رابطه دارای خواص بازتابی، تقارن و توپایی بوده و بنابراین يك رابطه هم‌ارزی است. در نتیجه این رابطه مجموعه تمام پاره‌خطهای جهت‌دار

۱- هرگاه A و B دو نقطه از صفحه باشند، پاره‌خط جهت‌دار AB را به صورت زوج مرتب (A, B) نیز نشان می‌دهند.

۲- انطباق را نیز حالتی از توازی می‌گیریم.

صفحه  $\pi$  را به دسته‌های هم‌ارزی افزاز می‌نماید. این دسته‌های هم‌ارزی به نام «بردارها» خوانده می‌شوند.




منظور از بردار  $\vec{AB}$ ، دسته هم‌ارزی پاره‌خطهای جهت‌داری است که با پاره‌خط  $\vec{AB}$  هم‌ارز می‌باشند. برای سهولت بردار  $\vec{AB}$  را با  $\vec{AB}$  نمایش می‌دهیم.

A را ابتدا و B را انتهای بردار  $\vec{AB}$  می‌خوانند. هرگاه  $\vec{AB}$  و  $\vec{CD}$  متعلق به يك دسته

هم‌ارزی باشند می‌نویسند:  $\vec{AB} = \vec{CD}$

و می‌خوانند بردار  $\vec{AB}$  مساوی بردار  $\vec{CD}$  است.



يك دسته هم‌ارزی

در شکل روبه‌رو مثالهای بیشتری برای روشن شدن مطلب ذکر شده است:

فرض کنید A، B، C و D نقاطی

از صفحه باشند که برای آنها داریم:

$\vec{AB} = \vec{CD}$  شکلهای روبه‌رو حالتی که

$\vec{AB}$  و  $\vec{CD}$


متعلق به يك دسته هم‌ارزی می‌باشند را نشان می‌دهند:

هرگاه بخواهیم نشان دهیم که  $\vec{AB}$



و  $\vec{CD}$  متعلق به يك دسته هم‌ارزی

نیستند می‌نویسیم:

$$\vec{AB} \neq \vec{CD}$$



این مطلب در شکلهای زیر نشان داده شده است :




به طور مشابهی اگر A، B، C، D و E  
نقاط مفروضی از صفحه باشند طوری که :

$$\vec{AB} = \vec{CD} = \vec{DE}$$

در این صورت ممکن است آنها را به صورت  
رو به رو نشان داد :


اما آنها را به صورتهای زیر نمی توان نشان داد :



### نمایش بردار


طبق آنچه گفته شد ، رابطه هم ارزی « هم طول و هم جهت بودن » ، در مجموعه خطوط  
جهت دار صفحه ، این مجموعه را به دسته های هم ارزی افزای می نماید . ما کلمه بردارها را  
برای این دسته های هم ارزی پاره خطها به کار برده هر دسته هم ارزی را با  $[\vec{a}]$  ،  $[\vec{b}]$  یا  $[\vec{x}]$

نمایش می دهیم :



نماینده دسته هم‌ا‌زی  $[a]$  را با  $\vec{a}$  نمایش داده وقتی می‌گوییم بردار  $\vec{a}$  منظورمان همین دسته هم‌ا‌زی  $[a]$  است. روشن است که در يك دسته هم‌ا‌زی هر کدام از پاره خطهای جهت‌دار ممکن است نماینده این دسته باشد.  
از آنچه گفته شد نتیجه می‌شود که :

$$\vec{a} = \vec{b} \iff [a] = [b]$$




### بردار مکان و نمایش ماتریسی آن

شکل روبه‌رو يك دسته بردارهای هم‌ارز را

در صفحه مختصات نشان می‌دهد :


همان‌طور که گفته شد هر کدام از این پاره خطهای جهت‌دار ممکن است به عنوان نماینده این دسته هم‌ارزی انتخاب شود. برای سهولت این نماینده را  $\vec{OP}$  یعنی برداری که ابتدای آن مبدأ مختصات است می‌گیریم. با این ترتیب همواره می‌توان نقطه ابتدای بردار دلخواه  $\vec{v}$  را مبدأ مختصات فرض نموده،

در نتیجه آن را با مختصات نقطه پایانش در صفحه مشخص کرد. از طرفی می‌دانید که مختصات نقطه P در صفحه با زوج مرتب  $(a, b)$  که در آن a طول و b عرض نقطه است نمایش داده



می شود . باتوجه به مطالب گفته شده  
می توان گفت که :

هر نقطه  $P(a, b)$  در صفحه يك بردار مثل  $\vec{OP}$  و هر بردار مثل  $\vec{OP}$  فقط و فقط يك نقطه را در صفحه مشخص می سازد .  
بردار  $\vec{OP}$  به نام بردار مکان نقطه  $P$  خوانده می شود .



در ماتریسها نیز دیدید که مختصات هر نقطه از صفحه مثل  $P(a, b)$  را می توان بایک ماتریس  $1 \times 2$  به صورت زیر نشان داد :

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

این ماتریس را نمایش ستونی بردار  $\vec{OP}$  خوانده و یا به طور خلاصه گفته می شود  $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  يك بردار ستونی است و می نویسند :

$$\vec{OP} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

همچنین مختصات نقطه  $P$  را می توان بایک ماتریس سطری به صورت  $[a \ b]$  نمایش داد :  
در این صورت گفته می شود  $\vec{OP}$  به طریق ماتریس سطری نشان داده شده یا به طور خلاصه  $[a \ b]$  يك بردار سطری است . و می نویسند :  $\vec{OP} = [a \ b]$   
و  $a$  و  $b$  را مؤلفه های بردار  $\vec{OP}$  می خوانند طبق آنچه گفته شد می توان گفت که :  
هر بردار را می توان بایک ماتریس سطری یا ستونی نشان داد .

۱- در اینجا ما به بردارهای وابسته که ابتدای آنها آزاد نیست مثل بردارهایی که برای نمایش نیرو یا خط نیرو به کار می روند کار نداریم .


## تساوی دو بردار ستونی یا سطری

دو بردار ستونی  $\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$  و  $\vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$  مساویند اگر و فقط اگر  $a_1 = b_1$  و

$a_2 = b_2$ . این مطلب در مورد دو بردار سطری  $\vec{a} = [a_1 \ a_2]$  و  $\vec{b} = [b_1 \ b_2]$  نیز درست است. پس:  $\vec{a} = \vec{b} \iff [(a_1 = b_1) \wedge (a_2 = b_2)]$

## بردار و انتقال

مجدداً قایقهای پارویی روی رودخانه را در نظر بگیرید که در یک زمان معین در نقاط A و B




B بوده پس از یک دقیقه به وسیله جریان رودخانه (پاروها فعلاً متوقف است) به ترتیب به نقاط A' و B' برده شده‌اند.

از نظر ریاضی جریان رودخانه را می‌توان به منزله اثر یک تبدیل<sup>۱</sup> در نظر گرفت که نقطه A را به A' و B را به B' برده است.

این تبدیل به نام انتقال خوانده می‌شود. هر یک از بردارهای  $\vec{AA'}$  یا  $\vec{BB'}$  را می‌توان نماینده این انتقال گرفت. بنابراین می‌توان گفت که:


هر بردار نظیر یک انتقال است و برعکس هر انتقال یک بردار را مشخص می‌سازد و یا به طور کلی‌تر: یک بردار نمایش انتقال تمام نقاط فضا است و  $\vec{AA'}$  و  $\vec{BB'}$ ، ... نمایشهای هم‌اثر این انتقال می‌باشند.

در زیر بردار  $\vec{AA'}$  با انتقال یک جسم صلب نشان داده شده است:



۱- یک تبدیل در صفحه عبارت است از یک تابع که در مجموعه نقاط صفحه تعریف شده است.

مثال ۱ - انتقالی در نظر بگیرید که هر نقطه از صفحه را ۳ واحد به موازات محور xها در جهت مثبت، تغییر مکان می‌دهد. بردار مکان این انتقال را مشخص نموده تعیین کنید این انتقال نقطه  $A(a, b)$  از صفحه را به چه نقطه‌ای منتقل خواهد کرد.



طبق آنچه گفته شد بردار مکان این انتقال برابر است با :


$$\vec{OP} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

و چون بردارهای  $\vec{OP}$  و  $\vec{AA'}$  يك انتقال را نشان می‌دهند پس مختصات  $A'$  برابر  $(a+3, b)$  خواهد بود. به عبارت دیگر، انتقال

مربور نقطه  $A(a, b)$  را به نقطه  $A'(a+3, b)$  منتقل می‌نماید.

مثال ۲ - انتقالی در نظر بگیرید که هر نقطه از صفحه را ۳ واحد به موازات محور xها در جهت مثبت و ۲ واحد به موازات محور yها در جهت منفی تغییر مکان دهد. بردار مکان این انتقال را مشخص نموده تعیین کنید این انتقال نقطه  $A(a, b)$  را به چه نقطه‌ای منتقل خواهد کرد. طبق آنچه گفته شد بردار مکان این انتقال برابر است با :

$$\vec{OP} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$




دو بردار  $\vec{OP}$  و  $\vec{AA'}$  متعلق به يك دسته هم‌ارزی بوده هر دو يك انتقال را نشان


می‌دهند. در نتیجه مختصات  $A'$  برابر است با  $(a+3, b-2)$ . یعنی انتقال مزبور نقطه  $(a, b)$  را به نقطه  $(a+3, b-2)$  منتقل می‌نماید.

### جمع بودارها

قایق پارویی را مجدداً در نظر گرفته، فرض کنید موقتاً هیچ نوع جریانی در رودخانه وجود نداشته باشد. روشن است که قایق بدون حرکت خواهد ماند. هرگاه سرنشینان قایق به طور یکنواختی در جهت معین پارو بزنند مادام که جریان وجود نداشته باشد قایق در جهت پاروها حرکت کرده نقطه  $A$  پس از يك دقیقه به نقطه  $B'$  خواهد رسید.



حال فرض کنید پاروها متوقف بوده و رودخانه به طور یکنواختی جریان پیدا نماید. این جریان پس از يك دقیقه نقطه  $A$  را به  $A'$  خواهد برد.








خوانده می شود . زیرا  $\vec{AA'}$  و  $\vec{AB'}$  دو ضلع مجاور متوازی الاضلاعی است که  $\vec{AB}$  (مجموع دوبردار) قطران می باشد .

ب :  $\vec{AA'} + \vec{A'B} = \vec{AB}$  یا  $\vec{AB'} + \vec{B'B} = \vec{AB}$  ، این تساویها به نام قانون مثلث

برای جمع بردارها خوانده می شود . زیرا  $\vec{AA'}$  و  $\vec{A'B}$  یا  $\vec{AB'}$  و  $\vec{B'B}$  دو ضلع مثلثی هستند که ضلع سوم آن  $\vec{AB}$  (مجموع دوبردار) می باشد .



بردارمجموع با دوپیکان نمایش داده شده است

در صورتی که  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  متقاطع نباشند :

در این صورت برای به دست آوردن

$\vec{a} + \vec{b}$  نماینده های دیگری از  $[\vec{a}]$  و

$[\vec{b}]$  به شکل زیر انتخاب می کنیم :

از نقطه دلخواه صفحه به ترتیب دوباره

خط  $\vec{EG}$  و  $\vec{GF}$  را هم ارز  $\vec{AB}$  و  $\vec{CD}$  (پاره

خطهای متناظر با  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$ ) رسم می کنیم تا مثلث

EGF به دست آید :

در اینجا طبق قانون مثلث برای جمع بردارها داریم :

$$\vec{EG} + \vec{GF} = \vec{EF} \quad (1)$$

$$\vec{EG} = \vec{AB} \text{ و } \vec{GF} = \vec{CD} : \text{ ازطرفی}$$

اگر در تساوی (1) به جای EG و GF هم ارزهای آنها را قرار دهیم خواهیم داشت :


$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{EF}$$

و یا :

$$\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{EF}$$


تساوی اخیر به سادگی نشان می دهد که  $\vec{EF}$  مجموع بردارهای  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  است .

هرگاه  $\vec{AB}$  و  $\vec{CD}$  روی یک محور به صورت زیر باشند :



آن گاه  $\vec{AB} + \vec{CD}$  مساوی چه برداری خواهد بود ؟

### جمع بردارهای سطری یا ستونی



دو بردار مکان  $\vec{OA} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

و  $\vec{OB} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$  را نظیر دو انتقال

گرفته فرض کنید این انتقالها به طور متوالی در نظر گرفته شوند ( اول

انتقال  $\vec{OA}$  و به دنبال آن انتقال

$\vec{OB}$  ) . از ترکیب این دو انتقال

متوالی ، انتقالی به دست می آید

که مستقیماً از O به B' بوده با

$\vec{OB'}$  مشخص می شود . به عبارت دیگر :

$$\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB'} = \vec{OB'} \quad (1)$$

اما در شکل دیده می شود برای این که از مبدأ مختصات به نقطه B' برسیم ابتدا باید ۵

واحد روی محور x ها در جهت مثبت و ۴ واحد به موازات محور y ها به طرف بالا حرکت کنیم .

یعنی بردار مکان نقطه B' برابر است با  $\vec{OB'} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$  . اکنون با توجه به بردارهای ستونی

$\vec{OA}$  و  $\vec{OB}$  و  $\vec{OB'}$  ، تساوی (۱) به صورت زیر نوشته می شود:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

یعنی : در جمع بردارهای ستونی مؤلفه های متناظر آنها با هم جمع می شود . به عبارت

دیگر ، هر گاه  $\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$  و  $\vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$  ، آن گاه داریم :

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{bmatrix}$$

این مطلب در مورد دو بردار سطری  $\vec{a} = [a_1 \ a_2]$  و  $\vec{b} = [b_1 \ b_2]$  نیز

درست است :


$$\vec{a} + \vec{b} = [a_1 \ a_2] + [b_1 \ b_2] = [a_1 + b_1 \ a_2 + b_2]$$

### خواص جمع بردارها

الف - قانون مثلث برای جمع بردارها را ممکن است برای جمع چند بردار نیز تعمیم


داد . در شکل زیر ، بردارهای  $\vec{a}$  ،  $\vec{b}$  و  $\vec{c}$  داده شده اند . برای به دست آوردن مجموع این سه بردار ، ابتدا می توان با استفاده از قانون مثلث ، مجموع  $\vec{a} + \vec{b}$  را به دست آورده سپس  $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$  را به منزله یک بردار گرفته طبق همان قانون مجموع آن را با  $\vec{c}$  حساب کرد .

در شکل زیر  $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$  نشان داده شده است :




مجموع فوق را بدین ترتیب نیز می توان به دست آورد که ابتدا  $(\vec{b} + \vec{c})$  را حساب

کرده ، سپس طبق قانون مثلث ، مجموع این بردار را با  $\vec{a}$  به دست آورد . در شکل زیر  $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$  نشان داده شده است :



در شکل زیر مردود حالت باهم دو نظر گرفته شده است :



در هر صورت مجموع سه بردار برابر  $\vec{EF}$  بوده داریم :

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{EF} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

و یا :


$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$


این تساوی که برای هر سه بردار  $\vec{a}$ ،  $\vec{b}$  و  $\vec{c}$  در مجموعه بردارها درست می باشد ، به نام خاصیت شرکت پذیری جمع بردارها خوانده می شود .

از حالا به بعد می نویسیم :

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

ب - شکل زیر نشان می دهد که اگر ما ترتیب جمع يك زوج بردار را عوض کنیم ، در مجموع آنها تغییری حاصل نمی شود :





در حقیقت می توان مثلث DEF را لغزانده کنار مثلث ABC به صورت رو به رو قرارداد پس :

$$\vec{AC} = \vec{DF} \text{ و یا } \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

این تساوی که برای هر دو بردار  $\vec{a}$  و  $\vec{b}$  در مجموعه بردارها درست می باشد ، به نام خاصیت جابجایی جمع بردارها خوانده می شود .

### طول يك بردار، بردار يکه، بردار صفر

پاره خط  $\vec{AB}$  را در نظر گرفته بردار نظیر آن را با  $\vec{a}$  نمایش می دهیم. بنا بر تعریف منظور از طول بردار  $\vec{a}$  طول پاره خط  $\vec{AB}$  است که آن را با  $|\vec{a}|$  نمایش می دهیم. هرگاه  $|\vec{a}| = 1$  ،  $|\vec{a}| = 1$  را بردار يکه و اگر  $|\vec{a}| = 0$  آن را بردار صفر می نامند . بردار صفر را معمولاً با  $\vec{0}$  نمایش داده آن را به عنوان دسته هم ارزی شامل پاره خطهای  $\vec{AA}$  ،  $\vec{BB}$  ،  $\vec{CC}$  ،  $\vec{OO}$  ، ... یعنی پاره خطهایی که ابتدا و انتهای آنها یکی است در نظر می گیرند :

$$\vec{AA} = \vec{0}$$

چون ابتدا و انتهای بردار صفر ممکن است مبدأ مختصات گرفته شود ، پس :


$$\vec{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

روشن است که هرگاه  $\vec{a}$  بردار مفروضی باشد داریم :

$$\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$$

$\vec{0}$  عضوی اثر جمع در مجموعه بردارها نامیده می شود .

۱- گر چه امتداد وجهت يك بردار صفر تعریف نشده است، ولی ما هر تك نقطه مانند A را برداری تعریف می كنیم كه طولش برابر با صفر و ابتدا و انتهایش بر A منطبق باشد .



طول بردار  $\vec{a}$ ، هرگاه  $\vec{a} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ، طبق

قضیه فیثاغورس از مثلث قائم الزاویه OMP به دست می آید :

$$|\vec{a}|^2 = b_1^2 + b_2^2$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

بردار وارون - طبق آنچه راجع به بردار صفر گفته شد می توان نوشت<sup>۱</sup> :



$$\vec{AA'} + \vec{A'A} = \vec{AA} = \vec{O} \quad (1)$$

$$\vec{A'A} + \vec{AA'} = \vec{A'A'} = \vec{O} \quad (2)$$


دو بردار  $\vec{AA'}$  و  $\vec{A'A}$  که مجموع آنها برابر صفر است و وارون یکدیگر نامیده می شوند و

$$\vec{AA'} = -\vec{A'A}$$

می نویسیم :

از نظر هندسی، وارون  $\vec{a}$  برداری است که طول آن مساوی  $\vec{a}$  بوده ولی جهت آن

مخالف  $\vec{a}$  می باشد.



روشن است که این دو بردار متعلق به یک دسته هم ارزی

نیستند. وارون  $\vec{a}$  را با  $-\vec{a}$  نمایش می دهیم.

طبق تساویهای (۱) و (۲) برای هر بردار مفروض  $\vec{a}$  داریم :

$$\vec{a} + (-\vec{a}) = (-\vec{a}) + \vec{a} = \vec{O}$$


یعنی، در مجموعه بردارها هر بردار دارای یک وارون است.

با استفاده از بردار وارون، بردار  $\vec{a} - \vec{b}$  را به صورت زیر تعریف می کنیم :

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

۱- در حقیقت نقطه A یا A' با دو انتقال به جای اول خود برگشته و مثل این است که A

تحت هیچ انتقالی ( $\vec{O}$ ) قرار نگرفته است.




مثال ۱ - انتقالی در نظر می‌گیریم که هر نقطه از صفحه را ۳ واحد به موازات محور  $x$ ها در جهت مثبت و ۲ واحد در امتداد محور  $y$ ها و در جهت منفی تغییر مکان دهد. الف - بردار مکان نظیر این انتقال را نوشته، تعیین کنید این انتقال نقطه  $A(2, 4)$  را به چه نقطه‌ای منتقل می‌نماید. ب - هرگاه نقطه  $A$  به  $A'$  منتقل شود، بردار  $\vec{AA'}$  را بر حسب  $\vec{OA}$  و  $\vec{OA'}$  بنویسید.

حل: الف - طبق آنچه قبلاً گفته شد بردار مکان این انتقال برابر است با:

$$\vec{OP} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$

این انتقال هر نقطه از صفحه را ۳ واحد در جهت مثبت محور  $x$ ها و ۲ واحد در جهت منفی محور  $y$ ها تغییر مکان می‌دهد. در نتیجه نقطه  $A(2, 4)$  را به نقطه  $A'(5, 2)$  منتقل می‌نماید.



$$\vec{OA'} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ب - طبق قانون جمع بردارها داریم:

$$\vec{OA} + \vec{AA'} = \vec{OA'}$$

اگر به طرفین این تساوی  $-\vec{OA}$  را اضافه کنیم خواهیم داشت:


$$(\vec{OA} + \vec{AA'}) + (-\vec{OA}) = \vec{OA'} + (-\vec{OA})$$

اما:


$$(\vec{OA} + \vec{AA'}) + (-\vec{OA}) = (-\vec{OA}) + (\vec{OA} + \vec{AA'}) = ((-\vec{OA}) + \vec{OA}) + \vec{AA'}$$



بنابراین طبق تعریف بردار وارون و تعریف تفاضل:  $\vec{O} + \vec{AA'} = \vec{OA'} - \vec{OA}$   
 و یا طبق تعریف عضو بی اثر:  $\vec{AA'} = \vec{OA'} - \vec{OA}$



یعنی: هرگاه بخواهیم برداری مثل  $\vec{AA'}$  را که ابتدا و انتهای آن بر مبدأ مختصات منطبق نیست برحسب بردار مکان ابتدا و بردار مکان انتهای آن بنویسیم، کافی است بردار مکان انتهای آن را منهای بردار مکان ابتدای آن کنیم:

$$\vec{AA'} = \vec{OA'} - \vec{OA}$$


هرگاه داشته باشیم  $A(a_1, a_2)$ ،  $A'(b_1, b_2)$  و  $\vec{AA'} = \vec{OP}$  آن گاه مختصات P برابر  $(b_1 - a_1, b_2 - a_2)$  خواهد بود.

هرگاه دو نقطه A و A' روی یک محور مثلاً محور xها باشند باز داریم:



اگر به طرفین این تساوی  $\vec{OA}$  را اضافه کنیم خواهیم داشت:

$$\vec{OA} + \vec{AA'} = \vec{OA} + (\vec{OA'} - \vec{OA}) = (\vec{OA'} + (-\vec{OA})) + \vec{OA} = \vec{OA'} + ((-\vec{OA}) + \vec{OA}) = \vec{OA'}$$

$$\vec{OA} + \vec{AA'} = \vec{OA'}$$

و یا:

مثال ۲- بردارهای  $\vec{OS} = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$  و  $\vec{OT} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$  داده شده‌اند، برای تعیین بردار


ستونی  $\vec{TS}$  بصورت زیر عمل می‌کنیم:

طبق مثال بالا داریم:


$$\begin{aligned}\vec{TS} &= \vec{OS} - \vec{OT} \\ &= \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

## تمرین

- ۱- فرق بردار  $\vec{AB}$  و پاره خط جهت‌دار  $\vec{AB}$  چیست ؟
- ۲- در زیر چند دسته هم‌ارزی از بردارها داده شده است :



الف - هر دسته را بایک نماینده مشخص نمایید. ب - مجموع این نماینده‌ها را با استفاده از قانون متوازی‌الاضلاع به دست آورید.



- ۳- در شکل رو به رو هر پاره خط نماینده یک بردار است ، حاصله‌های زیر را به دست آورید :


$$\begin{aligned}&\vec{AB} + \vec{BC} ; \vec{AB} + \vec{CA} ; (\vec{AB} + \vec{BC}) + \vec{AC} \\ &(\vec{AB} + \vec{BC}) + \vec{CA}\end{aligned}$$

- ۴- متوازی‌الاضلاع RSTU داده شده است. بردار  $\vec{US}$  را بر حسب بردارهای زیر به دست آورید:

$$\text{الف : } \vec{TS} \text{ و } \vec{UT} ; \text{ ب : } \vec{SR} \text{ و } \vec{ST}$$

د- بردارهای مساوی هریک از بردارهای زیر را بنویسید (مثلاً  $-\vec{QP} = \vec{PQ}$ )

$$-\vec{BD}, -\vec{FI}, \vec{HE}, -\vec{HB}, \vec{JB}, -\vec{AB}, \vec{DF}$$




ع- در شکل روبه رو هرپاره خط نمایند

یک بردار است؛ حاصل هر کدام از جمعهای داده

شده را به دست آورید.

$$\vec{AE} + \vec{EC}, \vec{DB} + \vec{BC}, \vec{AD} + \vec{DB} + \vec{BC}, \vec{DE} + (-\vec{BE})$$

$$\vec{CB} + \vec{BE} + \vec{EA} + \vec{AD}, \vec{AC} + (-\vec{BC}), \vec{CD} + \vec{BA} + (-\vec{BD})$$



ف- شکل روبه رو یک مکعب است و هر


پاره خط نمایند یک بردار می باشد. هر کدام از

حاصلهای زیر را بنویسید،

$$\vec{AB} + \vec{AD}, \vec{AB} + \vec{CC'}, \vec{AA'} + \vec{DC}, \vec{AA'} + \vec{CD}$$

$$\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}, \vec{AD} + \vec{B'D'} + \vec{CB}, \vec{AB} + \vec{B'D'}$$

$$\vec{AB'} + \vec{A'D'} + \vec{CB}, \vec{A'C} - \vec{AA'} + \vec{CD'}$$



۸- با استفاده از شکل روبه رو مقدار

$\vec{x}$  را در هریک از تساویهای زیر به دست

آورید :


$$\vec{x} + \vec{a} = \vec{w}, \vec{b} + \vec{x} = \vec{v} + \vec{u} + \vec{a},$$

$$\vec{v} = \vec{b} - \vec{x}, \vec{x} - \vec{w} = \vec{v}$$

۹- حاصلهای زیر را به دست آورید :

$$\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 1 \end{bmatrix}$$

۱۰- با استفاده از شکل زیر ، حاصلهای زیر را بایک بردارستونی نمایش دهید :



$$\vec{OA} + \vec{AF} ; \vec{FG} + \vec{GH} ; \vec{CD} + \vec{DH}$$

$$\vec{BG} + \vec{GH} + \vec{HJ} ; \vec{GJ} - \vec{CJ} ; \vec{OH} - \vec{CH}$$

$$(\vec{OA} + \vec{AF}) + (\vec{FH} + \vec{HI} + \vec{IJ}) + (\vec{JD} + \vec{DB})$$

۱۱- با استفاده از شکل فوق، تعیین کنید اولاً پاره خطهای جهت‌داری را که با  $\vec{OC}$  در یک دسته

هم‌ارزی قرار گرفته‌اند ، ثانیاً دسته بردارهایی را که  $\vec{OA}$  نماینده آنهاست مشخص نمایید .

۱۲- بردارهای  $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$  ،  $\vec{b} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$  و  $\vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$  داده شده‌اند ؛ نشان

دهید که :

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) ; \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} ; \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$$

۱۳- مطلوب است تعیین طول بردارهای زیر :

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix} , \vec{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \end{bmatrix} , \vec{c} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ \sqrt{5} \end{bmatrix} , \vec{d} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

۱۴- بردارهای  $\vec{OB} = \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \end{bmatrix}$  و  $\vec{BC} = \begin{bmatrix} -1 \\ 8 \end{bmatrix}$  داده شده‌اند؛ بردار مکان C را تعیین کنید.

۱۵- بردارهای  $\vec{OA} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$  و  $\vec{AB} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$  داده شده‌اند؛ بردار  $\vec{OB}$  را به طریق ستونی نمایش دهید.


۱۶- هرگاه داشته باشیم  $A(1, 2)$ ،  $B(4, 3)$  و  $C(6, 1)$ ، مطلوب است تعیین مختصات نقطه X در هر یک از تساویهای زیر:

$$\vec{AB} = \vec{CX} ; \vec{AX} = \vec{CB} ; \vec{XA} = \vec{CB} ; \vec{XA} = \vec{BC}$$

### ضرب يك عدد حقیقی در يك بردار


بردار  $2\vec{a}$  بنا بر تعریف عبارت است از:  $2\vec{a} = \vec{a} + \vec{a}$

همچنین تعریف می‌کند:  $3\vec{a} = 2\vec{a} + \vec{a}$



اگر  $r$  يك عدد حقیقی باشد،  $r\vec{a}$  برداری است که طول آن  $|r|$  برابر طول  $\vec{a}$  می‌باشد.

اگر  $r > 0$  باشد  $r\vec{a}$  و  $\vec{a}$  هم‌جهتند و اگر  $r < 0$ ،  $r\vec{a}$  و  $\vec{a}$  مختلف‌الجهت می‌باشند.




اگر  $r = -1$  داریم:  $r\vec{a} = -1 \times \vec{a}$

$-1 \times \vec{a}$  را برابر  $-\vec{a}$  گرفته همان‌طور که دیدید آن را وارون  $\vec{a}$  می‌خوانند.

مثال ۱- بردار  $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$  را در نظر گرفته بردارهای  $2\vec{a}$  و  $3\vec{a}$  را بنویسید.

حل : از روی شکل دیده می شود که :



$$2\vec{a} = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{OP}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$3\vec{a} = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{OP}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

در اینجا می بینیم که هرگاه

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \text{ بردار}$$

عدد حقیقی  $r$  در

ضرب شود، آن عدد در هر مؤلفه

آن ضرب می شود :

$$r\vec{a} = r \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} rb_1 \\ rb_2 \end{bmatrix}$$

اگر  $r = -1$  :

$$r\vec{a} = -1 \times \vec{a} = -1 \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_1 \\ -b_2 \end{bmatrix} = -\vec{a}$$

مثال ۲- هرگاه  $\vec{a} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$  و  $\vec{b} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$  دو بردار و  $s$  و  $t$  دو عدد حقیقی باشند

نشان دهید که :

$$r(\vec{a} + \vec{b}) = r\vec{a} + r\vec{b}$$

حل : داریم

$$r(\vec{a} + \vec{b}) = r \left( \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \right)$$

$$= r \left( \begin{bmatrix} b_1 + c_1 \\ b_2 + c_2 \end{bmatrix} \right)$$

تعریف جمع بردار ستونی :

$$= \begin{bmatrix} r(b_1 + c_1) \\ r(b_2 + c_2) \end{bmatrix}$$

ضرب یک عدد در یک بردار :

$$= \begin{bmatrix} rb_1 + rc_1 \\ rb_2 + rc_2 \end{bmatrix} \quad \text{توزیع پذیری در ضرب اعداد حقیقی} :$$

$$= \begin{bmatrix} rb_1 \\ rb_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} rc_1 \\ rc_2 \end{bmatrix} \quad \text{جمع بردار ستونی} :$$

$$= r \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \quad \text{ضرب يك عدد در يك بردار} :$$

$$= r \vec{a} + r \vec{b} \quad \text{طبق فرض} :$$

به همین ترتیب اگر  $r$  و  $t$  دو عدد حقیقی و  $\vec{a}$  يك بردار باشد می توان نشان داد که :


$$(r+t) \vec{a} = r \vec{a} + t \vec{a}$$

$$rt(\vec{a}) = r(t\vec{a})$$

### مؤلفه يك بردار روی يك محور (بردارهای پایه)

بردار  $\vec{c}$  را در صفحه مختصات در نظر گرفته

آن را به صورت زیر می نویسیم :



$$\vec{OP} = \vec{c} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

$$= a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

در اینجا بردارهای ستونی  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  و  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  به ترتیب بردارهای یکه روی محوره های  $x$  و  $y$  بوده


و بردارهای پایه نامیده می شوند. هرگاه قرار

دهیم :

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{i} ; \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{j}$$

در این صورت تساوی (1) به صورت زیر

نوشته می شود :



$$\vec{c} = a \vec{i} + b \vec{j}$$

بردارهای  $\vec{i}$  و  $\vec{j}$  به ترتیب مؤلفه های بردار  $\vec{c}$  روی محوره های  $x$  و  $y$  نامیده می شوند .

مثال ۱ - بردارهای  $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$  و  $\vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix}$  داده شده‌اند، الف - هر کدام از

این دو بردار را به صورت  $\vec{a}i + \vec{b}j$  نمایش دهید. ب - بردار  $(\vec{a} + \vec{b})$  را به صورت  $\vec{a}i + \vec{b}j$  نمایش دهید. ج - بردار  $2\vec{a}$  را به صورت  $\vec{a}i + \vec{b}j$  بنویسید.

حل :

$$\text{الف - } \vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ = 2\vec{i} + 3\vec{j}$$

$$\vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix} = 4\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 5\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ = 4\vec{i} - 5\vec{j}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (2\vec{i} + 3\vec{j}) + (4\vec{i} - 5\vec{j}) \\ = 6\vec{i} - 2\vec{j}$$

$$\text{ج - } 2\vec{a} = 2\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} \\ = 4\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 6\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ = 4\vec{i} + 6\vec{j}$$

یعنی اگر عددی مثل ۲ در بردار  $2\vec{i} + 3\vec{j}$  ضرب شود ۲ در ضرایب  $i$  و  $j$  یعنی ۲ و ۳ ضرب خواهد شد.


مثال ۲ - دو بردار  $\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$  و  $\vec{b} = 5\vec{i} - \vec{j}$  داده شده است؛ مجموع این دو بردار را به صورت یک بردار ستونی نمایش دهید.

$$\text{حل : } \vec{a} + \vec{b} = (2\vec{i} + 3\vec{j}) + (5\vec{i} - \vec{j}) \\ = (2\vec{i} + 5\vec{i}) + (3\vec{j} - \vec{j}) \\ = 7\vec{i} + 2\vec{j} \\ = 7\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



$$= \begin{bmatrix} \gamma \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma \\ \gamma \end{bmatrix}$$

مثال ۳- در شکل زیر فرض می‌کنیم :



$$\frac{\vec{AM}}{\vec{MB}} = -\frac{\lambda}{\mu} \quad (\lambda \text{ و } \mu \text{ اعداد حقیقی می‌باشند})$$

نشان دهید که :

$$\mu \vec{OA} + \lambda \vec{OB} = (\mu + \lambda) \vec{OM} \quad (۱)$$

حلی: در مثلث OAM رو به رو داریم:

$$\vec{OA} + \vec{AM} = \vec{OM}$$

همچنین از مثلث OMB به دست می‌آید :

$$\vec{OB} + \vec{BM} = \vec{OM}$$

طرفین این دو تساوی را به ترتیب در  $\mu$  و  $\lambda$  که ضرب کنیم حاصل می‌شود :

$$\mu \vec{OA} + \mu \vec{AM} = \mu \vec{OM}$$

$$\lambda \vec{OB} + \lambda \vec{BM} = \lambda \vec{OM}$$

این دو تساوی را نظیر به نظیر جمع می‌کنیم می‌شود :

$$\mu \vec{OA} + \mu \vec{AM} + \lambda \vec{BM} + \lambda \vec{OB} = (\lambda + \mu) \vec{OM}$$

و یا :

$$\mu \vec{OA} + \lambda \vec{OB} + (\mu \vec{AM} + \lambda \vec{BM}) = (\lambda + \mu) \vec{OM} \quad (۱)$$

ولی طبق فرض داریم :  $\mu \vec{AM} = \lambda \vec{MB}$  و یا :  $\mu \vec{AM} - \lambda \vec{MB} = \vec{0}$

$$\mu \vec{AM} + \lambda \vec{BM} = \vec{0} \quad (۲) \quad \text{و یا :}$$

هرگاه در تساوی (۱) مقدار (۲) را منظور بداریم خواهیم داشت :


$$\mu \vec{OA} + \lambda \vec{OB} = (\lambda + \mu) \vec{OM} \quad (۳)$$

و این همان مطلب خواسته شده است . تساوی (۳) را به صورت زیر نیز می‌نویسند :

$$\vec{OM} = \frac{\mu \vec{OA} + \lambda \vec{OB}}{\mu + \lambda}$$

به خصوص اگر  $M$  وسط  $AB$  باشد؛ خواهیم داشت :

$$\vec{OM} = \frac{\vec{OA} + \vec{OB}}{2}$$



این تساوی بردار مکان نقطه وسط يك بردار را بر حسب بردار مکان ابتدا و انتهای آن به دست می دهد .  
همچنین تساوی (۳) به صورت زیر نوشته می شود :

$$\mu \vec{OA} + \lambda \vec{OB} - (\lambda + \mu) \vec{OM} = \vec{0}$$

مثال ۴ - نشان دهید هرگاه خطی اوساط دو ضلع يك مثلث را به هم وصل نماید، موازی باضلع سوم و مساوی نصف آن است .

حل : در مثلث  $XAY$  داریم :

$$\vec{XA} + \vec{AY} = \vec{XY} \quad (1)$$

طرفین این تساوی را در عدد ۲ ضرب می کنیم :

$$2\vec{XA} + 2\vec{AY} = 2\vec{XY}$$

ولی طبق فرض داریم:  $2\vec{XA} = \vec{BA}$  و

$2\vec{AY} = \vec{AC}$  پس (۱) به صورت زیر نوشته می شود :

$$\vec{BA} + \vec{AC} = 2\vec{XY}$$

از طرفی در مثلث  $ABC$  داریم:  $\vec{BA} + \vec{AC} = \vec{BC}$  از مقایسه دو تساوی اخیر نتیجه می شود

که:  $\vec{BC} = 2\vec{XY}$  که باتوجه به تعریف ضرب يك عدد حقیقی دريك بردار نتیجه می شود که

$\vec{XY}$  موازی  $\vec{BC}$  بوده و طول آن نصف  $\vec{BC}$  است .

## تمرین

۱- حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید :

$$4 \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -1 & 3 \end{bmatrix}$$

۲- در تساویهای زیر  $r$  و  $s$  اعداد حقیقی هستند، آنها را پیدا کنید :


$$r \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \end{bmatrix} ; r \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$$

۳- در تساویهای زیر  $a$  و  $b$  اعداد حقیقی هستند؛ آنها را به دست آورید :

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix} = a \vec{i} + b \vec{j} ; \begin{bmatrix} 1 & -3 \end{bmatrix} = a \vec{i} + b \vec{j} ; \vec{i} = a \begin{bmatrix} -3 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{j} = a \begin{bmatrix} -3 & 1 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 & -3 \end{bmatrix} ; 3\vec{i} - 2\vec{j} = a(3\vec{i} + 4\vec{j}) + b(4\vec{i} + 3\vec{j})$$

۴- بردارهای  $\vec{a} = \begin{bmatrix} -a \\ 2b \end{bmatrix}$ ،  $\vec{b} = \begin{bmatrix} 3a \\ b \end{bmatrix}$  و  $\vec{c} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  داده شده‌اند؛



حاصلهای هریک از :

$$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$$

$$a\vec{i} + b\vec{j}$$

مقایسه کنید .

$$3\vec{i} + 5\vec{j}$$

را به صورت ترکیب خطی

$$2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{i} + 2\vec{j}$$

بنویسید .

۶- با توجه به شکل

مقابل حاصلهای زیر را به

دست آورید :

$$\text{الف} - \frac{1}{4}(\vec{OA} + \vec{OC}) ; \text{ب} - \frac{1}{5}(2\vec{BH} + 3\vec{BI}) ; \text{ج} - \frac{1}{11}(1 \cdot \vec{BF} + \vec{BC})$$

$$\text{د} - \frac{1}{13}(6\vec{BG} + 7\vec{BD}) ; \text{ه} - \vec{OA} - 2\vec{AF} + 3\vec{FG} ; \text{و} - \frac{1}{2}(\vec{CB} - \vec{DC})$$

$$\text{ز} - \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}) ; \text{ح} - \vec{OJ} - 4\vec{OC}$$


۷- در مسئله فوق نشان دهید که :

الف عبارت «الف» از تمرین ۶ نمایش برداری مثل  $\vec{OK}$  است که  $K$  وسط  $\vec{AC}$  می‌باشد .

بـ عبارت «ب» از تمرین ۶ نمایش برداری مثل  $\vec{BN}$  است که N پاره خط HI را به نسبت  $\frac{3}{2}$  تقسیم می کند :

جـ عبارت «ج» از تمرین ۶ نمایش برداری مثل  $\vec{BM}$  است که M پاره خط FC را به نسبت  $\frac{1}{10}$  تقسیم می کند .

دـ عبارت «د» از تمرین ۶ نمایش برداری مثل  $\vec{BM}$  است که M پاره خط GD را به نسبت  $\frac{7}{6}$  تقسیم می کند .



۸ـ در شکل روبه رو BC موازی AD و

$$\vec{BC} = \frac{3}{5} \vec{AD} \quad \text{و} \quad \vec{AB} \quad \text{و} \quad \vec{AD} \quad \text{به ترتیب نماینده}$$

بردارهای  $\vec{v}$  و  $\vec{u}$  می باشند .

بردارهای زیر را بر حسب این دو بردار پیدا کنید :

$$(\vec{BE} = \frac{3}{5} \vec{ED}) \quad \vec{AE} \quad \text{و} \quad \vec{BD}, \quad \vec{AC}, \quad \vec{BC}$$

## گروه

اواربست گالوا ریاضی‌دان فرانسوی اولین کسی است که نظریه گروهها را در ریاضیات به کار برد. وی در سن ۱۹ سالگی مطالعه منظم گروهها را شروع کرد و از این راه به حل مسائلی مربوط به معادلات موفق گردید که مورد بحث ریاضی‌دانان وقت بود.

نگره گروهها یکی از زیباترین شاخه‌های ریاضیات است و دارای کاربردهای زیادی در رشته‌های گوناگون از جمله فیزیک، شیمی و مکانیک کوانتم میباشد.

ما این فصل را با تعریف يك «عمل» روی يك مجموعه شروع میکنیم.

تعریف - فرض کنیم  $A$  يك مجموعه ناتهی باشد. يك عمل دوتائی و یا بطور ساده يك عمل روی مجموعه  $A$  عبارت از تابعی است روی  $A \times A$  در  $A$ . بعبارت دیگر يك عمل روی مجموعه  $A$  عبارت از قانونی است که بهر زوج مرتب از عناصر  $A$ ، يك عنصر منحصر بفرد از  $A$  را نسبت دهد.

يك عمل روی مجموعه  $A$  را با نمادهائی مانند  $*$ ،  $\circ$ ،  $\square$  و غیره نشان میدهند.

اگر  $*$  يك عمل روی مجموعه  $A$  باشد، عنصری از  $A$  که به زوج مرتب  $(a, b) \in A \times A$  نسبت داده میشود با  $a*b$  نشان داده میشود.

مثال ۱ - جمع معمولی « $+$ » يك عمل روی مجموعه اعداد درست است. همچنین ضرب معمولی « $\times$ » يك عمل روی مجموعه اعداد حقیقی است.

مثال ۲ - برای هر زوج مرتب  $(m, n)$  از اعداد طبیعی تعریف میکنیم:

$$m*n = m^2 + n$$

در اینصورت « $*$ » يك عمل روی مجموعه اعداد طبیعی است.

تعریف - گوئیم عمل « $*$ » روی مجموعه  $A$  دارای خاصیت جابجائی است، هرگاه برای هر  $a, b \in A$ ، داشته باشیم:

$$a*b = b*a$$

مثال ۱ - عمل « $+$ » روی مجموعه اعداد حقیقی دارای خاصیت جابجائی است. زیرا

برای هر  $a, b \in \mathbb{R}$ ، داریم:

$$a + b = b + a$$

مثال ۲ - عمل «□» را روی مجموعه اعداد درست بصورت زیر تعریف میکنیم:

$$m \square n = m^2 + n$$

بسادگی میتوان دید که «□» روی  $\mathbb{Z}$  دارای خاصیت جابجائی نیست زیرا برای مثال

$$2 \square 2 = 2^2 + 2 = 6$$

و حال آنکه

$$2 \square 3 = 2^2 + 3 = 7$$

تعریف - گوئیم عمل «\*» روی مجموعه A دارای خاصیت شرکت پذیری است، هرگاه

برای هر  $a, b, c \in A$  داشته باشیم:

$$(a*b)*c = a*(b*c)$$

مثال ۱ - عمل «+» روی مجموعه اعداد حقیقی دارای خاصیت شرکت پذیری، زیرا

$$(a+b)+c = a+(b+c) \quad \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$

مثال ۲ - عمل «o» را روی مجموعه اعداد طبیعی بصورت زیر تعریف میکنیم:

$$m \circ n = m \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$$

بسادگی میتوان دید که o روی N دارای خاصیت شرکت پذیری است زیرا اگر  $m, n, p$

اعداد طبیعی باشند، خواهیم داشت:

$$(m \circ n) \circ p = m \circ p = m$$

و:

$$m \circ (n \circ p) = m \circ n = m$$

تعریف - فرض کنیم G يك مجموعه ناتهی و «\*» يك عمل روی G باشد. G را همراه

با عمل «\*» يك گروه گوئیم، هرگاه خواص زیر برقرار باشد.

الف - عمل «\*» روی G دارای خاصیت شرکت پذیری باشد.

ب - در G عضوی مانند e وجود داشته باشد بطوریکه برای هر  $g \in G$ ، داشته باشیم:

$$g * e = e * g = g$$

e را عضو بی اثر عمل «\*» در G مینامیم.

پ - برای هر  $a \in G$ ، يك عنصر  $a' \in G$  وجود داشته باشد بطوریکه

$$a' * a = a * a' = e$$

$a'$  را عضو وارون a نسبت به عمل «\*» مینامیم.

مجموعه G همراه با عمل «\*» را گاهی با نماد  $(G, *)$  نشان میدهند.

تاکنون مثالهایی از يك گروه دیده اید بدون آنکه کلمه گروه ذکر شده باشد. به مثالهای

زیر توجه کنید.

مثال ۱ - مجموعه اعداد درست  $\mathbb{Z}$  همراه با عمل جمع «+» يك گروه است.

الف - عمل «+» روی  $\mathbb{Z}$  دارای خاصیت شرکت پذیری است زیرا:

$$(m+n)+p=m+(n+p) \quad \forall m, n, p \in \mathbb{Z}$$

$$((2+3)+5)=2+(3+5) \quad \text{(مثلا)}$$

ب- با عدد صفر آشنا هستید و می دانید که برای هر  $m \in \mathbb{Z}$  میتوان نوشت:

$$m+0=0+m=m$$

پ- همچنین میدانید که اگر  $m$  يك عدد درست باشد،

$$m+(-m)=(-m)+m=0$$

مثال ۲ - مجموعه اعداد گویا و مثبت یعنی:

$$Q^+ = \left\{ \frac{p}{q} : p, q \in \mathbb{N} \right\}$$

همراه با عمل ضرب «×» يك گروه است.

الف- عمل «×» روی  $Q^+$  دارای خاصیت شرکت پذیری است زیرا :

$$(a \times b) \times c = a(b \times c) \quad \forall a, b, c \in Q^+$$

$$\left( \left( \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \right) \times \frac{5}{6} = \frac{1}{2} \times \left( \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \right) \right) \quad \text{(مثلا)}$$

ب- با عدد يك «۱» آشنا هستید و می دانید که برای هر عدد گویا و مثبت  $\frac{p}{q}$  میتوان نوشت

$$(\frac{p}{q}, q \in \mathbb{N})$$

$$1 \times \frac{p}{q} = \frac{p}{q} \times 1 = \frac{p}{q}$$

پ - همچنین می دانید که اگر  $\frac{p}{q} \in Q^+$ ، پس  $\frac{q}{p} \in Q^+$  و علاوه بر این

$$\frac{p}{q} \times \frac{q}{p} = \frac{q}{p} \times \frac{p}{q} = 1$$

مثال ۳ - مجموعه ماتریسهای  $2 \times 2$  همراه با عمل جمع ماتریسها «+» يك

گروه است.

الف- همانطوریکه در فصل ماتریسها دیدید عمل «+» روی مجموعه ماتریسهای  $2 \times 2$

دارای خاصیت شرکت پذیری است یعنی اینکه اگر  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  و  $B = \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$

$C = \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix}$  سه ماتریس  $2 \times 2$  باشند، خواهیم داشت:

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

ب- همانطوریکه در فصل ماتریسها دیدید اگر  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  يك ماتریس  $2 \times 2$  باشد،

خواهیم داشت:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

یعنی اینکه  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  عنصر بی اثر عمل جمع در مجموعه ماتریسهای  $2 \times 2$  است.

پ- اگر  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  يك ماتریس  $2 \times 2$  باشد، خواهیم داشت:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

مثال ۴- مجموعه اعداد طبیعی

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

همراه با عمل جمع يك گروه نیست، زیرا  $(N, +)$  دارای خاصیت (ب) از تعریف يك گروه نیست.

مثال ۵- مجموعه  $I = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$  همراه با عمل جمع يك گروه نیست زیرا خاصیت

(پ) از تعریف يك گروه در اینجا برقرار نیست. برای مثال عنصر ۳ از  $I$  دارای وارون نیست.

مثال ۶- مجموعه اعداد درست  $Z$  همراه با عمل تفریق «-» يك گروه نیست، زیرا خاصیت

(الف) از تعریف يك گروه در اینجا برقرار نیست. برای مثال

$$15 - (4 - 12) \neq (15 - 4) - 12$$

مثال ۷- مجموعه اعداد حقیقی  $R$  همراه با عمل ضرب يك گروه نیست، زیرا عنصر صفر

دارای وارون نمیباشد.

تعریف- اگر  $(G, *)$  يك گروه و  $*$  دارای خاصیت جابجائی باشد،  $(G, *)$  يك گروه

جابجائی (و یا يك گروه ابدی) نامیده میشود.

برای مثال  $(R, +)$  يك گروه جابجائی است.

بعنوان تمرین تحقیق کنید کداميك از مثالهای قبل يك گروه جابجائی است.



## خواص مقدماتی گروه‌ها

میدانیم که در هر گروه  $(G, *)$  يك عنصر بی‌اثر وجود دارد و هر عنصر  $g$  از  $G$  دارای عنصر وارون است. قضیه‌های زیر نشان میدهند که عنصر بی‌اثر و عنصر وارون هر عنصر در يك گروه منحصر بفرد می‌باشند.

قضیه ۱ - در هر گروه  $(G, *)$ ، عنصر بی‌اثر منحصر بفرد است (یعنی اینکه هر گروه تنها دارای يك عنصر بی‌اثر است).

اثبات - اگر  $e_1$  و  $e_2$  عنصرهای بی‌اثر در گروه  $(G, *)$  باشند، خواهیم داشت:

$$(1) \quad e_1 * g = g * e_1 = g \quad \forall g \in G$$

$$(2) \quad e_2 * g = g * e_2 = g \quad \forall g \in G$$

بنابر (۱) داریم:

$$e_1 * e_2 = e_2$$

و بنابر (۲) داریم:

$$e_1 * e_2 = e_1$$

از این دو تساوی نتیجه میشود که  $e_1 = e_2$ ، و بنابراین قضیه ثابت است.

قضیه ۲ - در هر گروه  $(G, *)$  هر عنصر  $g$  از  $G$  تنها دارای يك وارون است (یعنی اینکه عنصر وارون هر عنصر از  $G$  منحصر بفرد است).

اثبات - فرض کنیم  $e$  عنصر بی‌اثر گروه  $(G, *)$  بوده و  $g$  متعلق به  $G$  باشد. اگر  $g'$  و  $g''$  عنصرهای وارون  $g$  باشند، خواهیم داشت:

$$g' * g = g * g' = e \quad \text{و} \quad g'' * g = g * g'' = e$$

بنابراین:

$$g' = e * g' = (g'' * g) * g' = g'' * (g * g') = g'' * e = g''$$

یعنی اینکه عنصر وارون هر عنصر از  $G$  منحصر بفرد است.

## تمرینات:

تمرین ۱ - آیا جمع و یا ضرب معمولی يك عمل روی هریک از مجموعه‌های زیر است؟

الف-  $A = \{1, 2, 3, 4\}$

ب-  $B = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$

پ-  $C = \{2, 4, 6, \dots\}$

تمرین ۲ - اگر  $m, n$  اعداد طبیعی باشند، تعریف میکنیم:

الف -  $m * n = m + n + mn$

ب -  $mon = m^2 + n^2$

پ -  $m \square n = m + 2n$

i - تحقیق کنید که هر يك از « $\square$ »، « $0$ » و « $*$ » يك عمل روی  $N$  میباشد.

ii - کداميك از این عمل‌ها روی  $N$  دارای خاصیت شرکت پذیری است؟

iii - کداميك از این عمل‌ها روی  $N$  دارای خاصیت جابجائی است؟

تمرین ۳ - عمل « $*$ » را روی  $N$  بصورت زیر تعریف میکنیم:

$$m * n = m^n \quad \forall (m, n) \in N \times N$$

الف - آیا « $*$ » روی  $N$  دارای خاصیت جابجائی است؟

ب - آیا « $*$ » روی  $N$  دارای خاصیت شرکت پذیری است؟

تمرین ۴ - عمل « $0$ » را روی  $Z$  بصورت زیر تعریف میکنیم:

$$mon = m + n + mn \quad \forall (m, n) \in Z \times Z$$

الف - عضو بی‌اثر این عمل را پیدا کنید.

ب - عضو وارون هر عضو از  $Z$  را نسبت به این عمل بدست آورید.

تمرین ۵ - عمل « $*$ » روی مجموعه  $\{e, x, y, z\}$  طبق جدول زیر تعریف شده است.

$*$	$e$	$x$	$y$	$z$
$e$	$e$	$x$	$y$	$z$
$x$	$x$	$e$	$y$	$z$
$y$	$y$	$z$	$e$	$x$
$z$	$z$	$y$	$x$	$e$

الف - عضو بی‌اثر « $*$ » را مشخص کنید.

ب - عضو وارون هر عضو از مجموعه  $\{e, x, y, z\}$  را بدست آورید.

تمرین ۶ - عمل « $*$ » را روی مجموعه  $\{0, 1, 2\}$  طبق جدول زیر تعریف میکنیم:

$*$	$0$	$1$	$2$
$0$	$0$	$2$	$1$
$1$	$1$	$0$	$2$
$2$	$2$	$1$	$0$

آیا (\*) و  $\{0, 1, 2\}$  يك گروه است؟ دليل پاسخ خود را بيان كنيد .  
 تمرين ۷- تعيين كنيد کداميك از مجموعه‌های زیر همراه با عمل ضرب معمولی يك گروه است .

$$\{-1, 0, 1\}$$

الف-

N

ب-

تمرين ۸- آیا مجموعه  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right\}$

همراه با عمل ضرب ماتریسهای  $2 \times 2$  يك گروه است ؟ دليل پاسخ خود را  $\left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$  بيان كنيد .

